

اصول نسخه خوانی

دکتر فروزان احمدپور
متخصص داروسازی بالینی
هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی
لرستان



تعریف

- نسخه عبارت است از یک دستور دارویی که به صورت کتبی و یا شفاهی از طرف پزشک، دندانپزشک، ماما، داروساز بالینی و سایر افرادی که مطابق قانون اجازه تجویز دارو را داشته باشند، صادر می گردد.
- ویژگی یک نسخه دارویی: ارائه دستور دارویی معین در زمان مشخص جهت فردی مشخص



مشخصات یک نسخه دارویی

۱- نام، ادرس و تلفن نویسنده نسخه

۲- نام و ادرس و سن بیمار

۳- تاریخ نوشتن نسخه

قید تاریخ نوشتن نسخه برای استناد در موارد قانونی و درمانی ضروریست.

در مورد نسخ قابل تجدید در صورتی که بیش از ۶ ماه از تاریخ نوشتن نسخه بگذرد، پیچیدن آن غیر مجاز است.

در بسیاری از کشورها یک نسخه ۳-۶ ماه اعتبار دارد.


عنوان نسخه و سر نسخه

- سمبل Rx
- به معنای recipe یا دریافت کنید.
- مورخین این سنبل را نماد ستاره ژوپیتر به عنوان کمک دهنده و یاری رسان می دانند.



۶ عامل مشخص در مورد هر قلم دارویی در نسخه

- ۱- نام دارو
- ۲- شکل دارو
- ۳- واحد دارویی
- ۴- تعداد دارو
- ۵- نحوه مصرف دارو
- ۶- فواصل تجویز دارو



علائم اختصاری مربوط به شکل دارویی

قرص	Tablet	Tab
کپسول	Capsule	Cap
آمپول	Ampoule	Amp
قطره	Drop	Drop
پماد	Ointment	Oint
لوسیون	Lotion	Lot
شیاف	Suppository	Supp
شربت	Syrup	Syr
سوسپانسیون	Suspension	Susp
الگزیر	Elixir	El,elix
طولانی اثر	Long action	LA

علائم اختصاری مربوط به زمان و دفعات مصرف دارو

علامت اختصاری	معادل انگلیسی	معادل فارسی
H-hr	Hour	ساعت
Min	Minute	دقیقه
AM	Ante Meridiem	از ۱۲ شب تا ۱۲ ظهر
PM	Post Meridiem	از ۱۲ ظهر تا ۱۲ شب
MD	Mid Day	۱۲ ظهر
MN	Mid Night	۱۲ شب
Q	quaque	هر-هر یک
q.h	quaque hora	هر ساعت
q.2h	quaque 2 hora	هر ۲ ساعت
Qd	quaque die	هر روز
BD,BID	Bis in die	روزی دو بار
TDS	Ter die sumendum	روزی سه بار
QID	Quarter in die	روزی چهار بار
HS	Hora somni	موقع خواب
a.c	Ante cibum	قبل از غذا
p.c	Post cibum	بعد از غذا
PRN	Pro re nata	در صورت لزوم
Stat	stat At once	بلافاصله-فورا

علائم اختصاری مربوط به روش تجویز

GT	Gastrostomy tube	لوله گاستروستومی
NG	Nasogastric Tube	لوله بینی معده ای
NJ	Nasojejunal Tube	لوله بینی دوازدهه
PO	Per Oral	از راه دهان
IV	Intravenous	از راه داخل وریدی
IM	Intramuscular	از راه داخل عضلانی
SC,SQ	Subcutaneous	از راه زیر جلدی
Id	Intradermal	از راه داخل جلدی
PR	Per rectal	از راه رکتوم
SL	Sublingual	زیر زبانی
Od	Oculus dexter	چشم راست
Os	Oculus sinister	چشم چپ
Ou	Oculus uterque	هر دو چشم

علائم اختصاری مربوط به واحدهای اندازه گیری

Gtt	Drop	قطره
ml	milliliter	میلی لیتر
cc	Cubic centimeter	سانتی متر مکعب
dl	deciliter	دسی لیتر
L	litre	لیتر
Oz	Ounce	اونس
Tsp	Tea spoon	قاشق چایخوری
Tbsp	Table spoon	قاشق غذاخوری
Kg	Kilogram(weight)	کیلو گرم
Gr	gram	گرم
Mg	Milligram	میلی گرم
μg	Microgram	میکرو گرم
	pound	پوند
Wt	Weight	وزن
	meq	میلی اکی والان

سایر اختصارات رایج

RPO	Repeat please order	تکرار دستورات قبلی
D.C	Discontinue	قطع
NPO	Non per oral	ناشتا

Over the counter (OTC drugs)

ردیف	نام دارو	شکل دارویی	راه مصرف	دسته دارو	توضیحات	تاریخ
No	Drug Name	Dosage Form	Route of Admin	ATC Code	Description	Date
۱	A.C.A*	TABLET	ORAL	N02BE۰۱	Acetaminophen ۳۵۰mg+caffeine ۶۵mg+ASA ۳۵۰mg	
۲	A.C.A*	TABLET	ORAL	N02BE۰۱	Acetaminophen ۱۶۲.۵mg+caffeine ۳۲.۵mg+ASA ۳۲۵mg	
۳	Acetaminophen ۳۲۵ mg	CAPSULE, GELATIN COATED	ORAL	N02BE۰۱	-	
۴	Acetaminophen ۱۰۰ mg/ml	SUSPENSION	ORAL	N02BE۰۱	-	
۵	Acetaminophen ۱۰۰ mg/ml	SOLUTION	ORAL	N02BE۰۱	-	
۶	Acetaminophen ۱۲۰ mg/۵ml	SUSPENSION	ORAL	N02BE۰۱	-	
۷	Acetaminophen ۱۲۰ mg/۵ml	SOLUTION	ORAL	N02BE۰۱	-	
۸	Acetaminophen ۱۲۵ mg	SUPPOSITORY	RECTAL	N02BE۰۱	-	
۹	Acetaminophen ۱۲۵ mg	TABLET, DISINTEGRATING	ORAL	N02BE۰۱	به شرط تولید در داخل کشور	۱۳۸۹/۷/۱۷
۱۰	Acetaminophen ۱۶۰ mg	TABLET, DISPERSIBLE	ORAL	N02BE۰۱	به شرط تولید در داخل کشور	۱۳۸۹/۶/۲۹

۱۱	Acetaminophen ۳۵۰ mg	TABLET, DISINTEGRATING	ORAL	N۰۲BE۰۱	به شرط تولید در داخل کشور	۱۳۸۹/۷/۱۷
۱۲	Acetaminophen ۳۲۵ mg	SUPPOSITORY	RECTAL	N۰۲BE۰۱	-	
۱۳	Acetaminophen ۳۲۵ mg	TABLET	ORAL	N۰۲BE۰۱	-	
۱۴	Acetaminophen ۵۰۰ mg	TABLET	ORAL	N۰۲BE۷۱	-	
۱۵	Acetaminophen ۵۰۰ mg	CAPSULE, GELATIN COATED	ORAL	N۰۲BE۷۱	-	
۱۶	Acetaminophen ۵۰۰ mg	TABLET, EFFERVESCENT	ORAL	N۰۲BE۷۱	Soluble	
۱۷	Acetaminophen ۵۰۰ mg	TABLET, DISINTEGRATING	ORAL	N۰۲BE۰۱	به شرط تولید در داخل کشور	۱۳۸۹/۷/۱۷
۱۸	Acetaminophen ۸۰ mg	TABLET, DISPERSIBLE	ORAL	N۰۲BE۰۱	-	
۱۹	Acetaminophen/Caffeine ۵۰۰/۶۵ mg	TABLET	ORAL	N۰۲BE۵۱	Acetaminophen ۵۰۰mg + Caffeine ۶۵mg	
۲۰	Acetaminophen/Caffeine/Ibuprofen	CAPSULE	ORAL	M۰۱AE۵۱	Acetaminophen ۳۲۵mg + Caffeine (۳۰-۴۰) mg + Ibuprofen ۲۰۰mg	

٢١	Adult Cold Preparations_١: (Decongestant+ Analgesic)	Tablet	Oral	R•X	As Decongestant: Phenylephrine HCl (٥mg) or Pseudoephedrine HCl (٣٠mg ,١٢٠mg) ,As Analgesic: Acetaminophen (٣٥٠,٣٢٥, ٥٠٠ mg) or Ibuprofen(٢٠٠mg) or Naproxen sodium(٢٢٠mg), The combinations to be exist in international Pharmacopoeia	
٢٢	Adult Cold Preparations_١: (Decongestant+ Analgesic)	Capsule, Liquid filled	Oral	R•X	As Decongestant: Phenylephrine HCl (٥mg) or Pseudoephedrine HCl (٣٠mg ,١٢٠mg) ,As Analgesic: Acetaminophen (٣٥٠,٣٢٥, ٥٠٠ mg) or Ibuprofen(٢٠٠mg) or Naproxen sodium(٢٠٠mg), The combinations to be exist in international Pharmacopoeia	
٢٣	Adult Cold Preparations_٢: (Decongestant + Expectorant+ Analgesic)	Tablet	Oral	R•X	As Decongestant: Pseudoephedrine HCl (٣٠ mg),As Expectorant : Guaifenesin (٢٠٠ mg), As Analgesic: Acetaminophen (٣٢٥ mg), The combinations to be exist in international Pharmacopoeia	
٢٤	Adult Cold Preparations_٢: (Decongestant + Expectorant+ Analgesic)	Capsule, Liquid filled	Oral	R•X	As Decongestant: Pseudoephedrine HCl (٣٠ mg),As Expectorant : Guaifenesin (٢٠٠ mg), As Analgesic: Acetaminophen (٣٢٥ mg), The combinations to be exist in international Pharmacopoeia	
٢٥	Adult Cold Preparations_٣: (Antihistamine + Analgesic)	Tablet	Oral	R•X	As Antihistamine: Chlorpheniramine maleate(٤mg) or Diphenhydramine HCl (١٢.٥ ,٢٥mg), As Analgesic : Acetaminophen (٣٢٥, ٥٠٠ mg), The combinations to	
٢٦	Adult Cold Preparations_٣: (Antihistamine + Analgesic)	Capsule, Liquid filled	Oral	R•X	As Antihistamine: Chlorpheniramine maleate(٤mg) or Diphenhydramine HCl (١٢.٥ ,٢٥mg), As Analgesic : Acetaminophen (٣٢٥, ٥٠٠ mg), The combinations to be exist in international Pharmacopoeia	
٢٧	Adult Cold Preparations_٤: (Decongestant +Antihistamine+ Analgesic)	Tablet	Oral	R•X	As Analgesic: Acetaminophen (١٦٢.٥ , ٣٠٠,٣٢٥, ٥٠٠ , ٩٥٠ mg) ,As Decongestant: Phenylephrine HCl (٥,١٠ mg) or Pseudoephedrine (٣٠,٦٠mg) , As Antihistamine: Diphenhydramine HCl (١٢.٥, ٢٥ mg) or Chlorpheniramine maleate (٤ , ٤ mg) or Clemastine fumarate (٠.٣٣٥mg), The combinations to be exist in international Pharmacopoeia	

28	Adult Cold Preparations_୧: (Decongestant +Antihistamine+ Analgesic)	Capsule, Liquid filled	Oral	R-X	As Analgesic: Acetaminophen (୧୧.୦ , ୩୦.୩୨.୦ , ୫୦.୦ mg) ,As Decongestant: Phenylephrine HCl (୦.୧୦ mg) or Pseudoephedrine (୩.୦ mg) , As Antihistamine: Diphenhydramine HCl (୧୧.୦ , ୨୫ mg) or Chlorpheniramine maleate (୧ , ୨ mg) or Clemastine fumarate (୦.୩୩mg), The combinations to be exist in international Pharmacopoeia	
29	Adult Cold Preparations_୨: (Antitussive + Decongestant + Analgesic)	Tablet	Oral	R-X	As Antitussive: Dextromethorphan HBr (୧୦.୧୫mg) , As Decongestant : Pseudoephedrine HCl (୩ mg) or Phenylephrine HCl (୦ mg), As Analgesic: Acetaminophen (୩୨.୫-୫୦.୦) , The combinations to be exist in international Pharmacopoeia	
30	Adult Cold Preparations_୩: (Antitussive + Decongestant + Analgesic)	Capsule, Liquid filled	Oral	R-X	As Antitussive: Dextromethorphan HBr (୧୦.୧୫mg) , As Decongestant : Pseudoephedrine HCl (୩ mg) or Phenylephrine HCl (୦ mg), As Analgesic: Acetaminophen (୩୨.୫-୫୦.୦) , The combinations to be exist in international Pharmacopoeia	
31	Adult Cold Preparations_୪: (Antitussive+ Antihistamine+ Analgesic)	Tablet	Oral	R-X	As Analgesic : Acetaminophen(୩୦.୦ mg), As antihistamine: Chlorpheniramine maleate (୨ mg) , As Antitussive: Dextromethorphan(୧୫ mg) , The combinations to be exist in international Pharmacopoeia	
32	Adult Cold Preparations_୫: (Antitussive+ Antihistamine+ Analgesic)	Capsule, Liquid filled	Oral	R-X	As Analgesic : Acetaminophen(୩୦.୦ mg), As antihistamine: Chlorpheniramine maleate (୨ mg) , As Antitussive: Dextromethorphan(୧୫ mg) , The combinations to be exist in international Pharmacopoeia	
33	Adult Cold Preparations_୬: (Antitussive+ Antihistamine+ Decongestant+ Analgesic)	Tablet	Oral	R-X	As Antitussive : Dextromethorphan(୧୦.୧୫ mg), As Antihistamine: Chlorpheniramine maleate (୨ mg) , As Decongestant : Pseudoephedrine (୩ mg) or Phenylephrine HCl (୦ mg), As Analgesic: Acetaminophen (୨୫.୦ , ୩୨.୫-୫୦.୦ mg), The combinations to be exist in international Pharmacopoeia	
34	Adult Cold Preparations_୭: (Antitussive+ Antihistamine+ Decongestant+ Analgesic)	Capsule, Liquid filled	Oral	R-X	As Antitussive : Dextromethorphan(୧୦.୧୫ mg), As Antihistamine: Chlorpheniramine maleate (୨ mg) , As Decongestant : Pseudoephedrine (୩ mg) or Phenylephrine HCl (୦ mg), As Analgesic: Acetaminophen (୨୫.୦ , ୩୨.୫-୫୦.୦ mg), The combinations to be exist in international Pharmacopoeia	
35	Adult Cold Preparations_୮: (Antitussive+ Expectorant+ Decongestant+ Analgesic)	Capsule, Liquid filled	Oral	R-X	As Antitussive : Dextromethorphan (୧୦ , ୧୫ mg), As Expectorant : Guaifenesin (୧୦୦ , ୨୦୦ mg), As Decongestant : Pseudoephedrine HCl (୩mg) or Phenylephrine HCl (୦mg), As Analgesic: Acetaminophen(୨୫.୦ , ୩୨.୫ mg), The combinations to be exist in international Pharmacopoeia	

36	Adult Cold Preparations₁: (Antitussive+ Expectorant+ Decongestant+ Analgesic)	Tablet	Oral	R-AX	As Antitussive : Dextromethorphan (10, 15 mg), As Expectorant : Guaifenesin (100, 200 mg), As Decongestant : Pseudoephedrine HCl (30 mg) or Phenylephrine HCl (5mg), As Analgesic: Acetaminophen(250, 325 mg), The combinations to be exist in international Pharmacopoeia	
37	Aluminium Hydroxide 300 mg	TABLET, CHEWABLE	ORAL	A-2AB-1	“(as Dried Gel)”	
38	Aluminium Hydroxide 320 mg/5ml	SUSPENSION	ORAL	A-2AB-1	“(as Gel)”	
39	Aluminium/Magnesium 200/200 mg	TABLET, CHEWABLE	ORAL	A-2AX	Aluminium hydroxide 200 mg + magnesium hydroxide 200 mg	
40	Aluminium/Magnesium 225/200 mg/5ml	SUSPENSION	ORAL	A-2AX	(Aluminium hydroxide 225mg+magnesium hydroxide 200)/5ml	
41	Aluminium/Magnesium 225/200 mg/5ml, 10 ml	SUSPENSION	ORAL	A-2AX	(Aluminium hydroxide 225mg+magnesium hydroxide 200 mg)/5ml **Sachet**	
42	Aluminium/Magnesium 565/175 mg	POWDER, FOR SUSPENSION	ORAL	A-2AX	(Aluminium hydroxide 565mg + Magnesium hydroxide 175mg)/sachet	
43	Aluminium/Magnesium/Simethico ne	SUSPENSION	ORAL	A-2AF-2	(Aluminium hydroxide 225mg+magnesium hydroxide 200 mg+simethicone 25mg)/5ml	
44	Aluminium/Magnesium/Simethico ne	TABLET, CHEWABLE	ORAL	A-2AF-2	Aluminium hydroxide 200 mg+magnesium hydroxide 200 mg+simethicone 25mg	
45	Aluminium/Magnesium/Simethico ne 10 ml	SUSPENSION	ORAL	A-2AF-2	(Aluminium hydroxide 225mg+magnesium hydroxide 200 mg+simethicone 25mg)/5ml**SACHET**	
46	Antihemorrhoid	OINTMENT	RECTAL	C-5AD-1	(Lidocaine 50 mg+hydrocortisone acetate 2.50mg+aluminium subacetate 25mg+zinc oxide 150 mg)/g	
47	Antihemorrhoid	SUPPOSITORY	RECTAL	C-5AD-1	Lidocaine 50 mg+hydrocortisone acetate 50mg+aluminium subacetate 50 mg+zinc oxide 500 mg	
48	Antihistamine Decongestant*	CAPSULE, GELATIN COATED	ORAL	R-1BA-1	Chlorpheniramine maleate 2 mg + Pseudoephedrine HCl 30 mg	
49	Antihistamine Decongestant*	CAPSULE, EXTENDED RELEASE	ORAL	R-1BA-1	Brompheniramine Maleate 12mg+ Pseudoephedrine HCl 120 mg	
50	Antihistamine Decongestant*	TABLET, EXTENDED RELEASE	ORAL	R-1BA-1	Brompheniramine Maleate 12mg+ Pseudoephedrine HCl 120 mg	
51	Antihistamine Decongestant*	TABLET	ORAL	R-1BA-1	Chlorpheniramine maleate 2 mg + Pseudoephedrine HCl 30 mg	
52	Artificial Saliva	SPRAY, SOLUTION	ORAL	A19AX	-	

53	Artificial Saliva	GEL	ORAL	A19AX	-	
54	Artificial Tears	GEL	OPHTHALMIC	S11XA20	-	
55	Artificial Tears	SOLUTION	OPHTHALMIC	S11XA20	-	
56	ASA (Acetylsalicylic Acid) 100 mg*	TABLET, CHEWABLE	ORAL	B11AC09	-	
57	ASA (Acetylsalicylic Acid) 100 mg*	TABLET, DELAYED RELEASE	ORAL	N12BA01	Microcoated	
58	ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg*	TABLET, DELAYED RELEASE	ORAL	N12BA01	-	
59	ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg*	SUPPOSITORY	RECTAL	N12BA01	-	
60	ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg*	TABLET	ORAL	N12BA01	-	
61	ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg*	TABLET, EFFERVESCENT	ORAL	N12BA01	-	
62	ASA (Acetylsalicylic Acid) 500 mg*	TABLET, DELAYED RELEASE	ORAL	N12BA01	-	
63	ASA (Acetylsalicylic Acid) 80 mg*	TABLET, DELAYED RELEASE	ORAL	B11AC09	-	
64	ASA/Ascorbic acid 600/250 mg	TABLET, EFFERVESCENT	ORAL	N12BA01	Acetylsalicylic acid 600mg+Ascorbic acid 250mg	
65	Benzocaine 5%	OINTMENT	TOPICAL	D19AB09	-	
66	Betacarotene 15 mg	CAPSULE	ORAL	A11CA02	-	
67	Bisacodyl 10 mg*	SUPPOSITORY	RECTAL	A09AB02	-	
68	Bisacodyl 5 mg	SUPPOSITORY	RECTAL	A09AB02	-	
69	Bisacodyl 5 mg*	TABLET, DELAYED RELEASE	ORAL	A09AB02	-	
70	Bismuth	BULK		V03	-	

٧١	Bismuth Subcitrate ١٢٠ mg	TABLET	ORAL	A٠٢BX٠٥	-	
٧٢	Bromhexine Hydrochloride mg	TABLET	ORAL	R٠٥CB٠٢	-	
٧٣	Bromhexine Hydrochloride mg/٥ml	ELIXIR	ORAL	R٠٥CB٠٢	-	
٧٤	Burn Ointment	OINTMENT	TOPICAL	D٠٢AA	Cod liver oil ٥٠٪+Zinc oxide ٢٠٪	
٧٥	Calamine ٨٪	CREAM	TOPICAL	D٠٢AB	-	
٧٦	Calamine ٨٪	LOTION	TOPICAL	D٠٢AB	-	
٧٧	Calcium Pantothenate ١٠٠ mg	TABLET	ORAL	A١١HA٢١	-	
٧٨	Charcoal Activated ٢٥٠ mg	TABLET	ORAL	A٠٧BA٠١	-	
٧٩	Charcoal Activated ٣٠ g/٢٤٠ ml	SUSPENSION	ORAL	A٠٧BA٠١	-	
٨٠	Charcoal Activated ٥٠ g	POWDER, FOR SUSPENSION	ORAL	A٠٧BA٠١	-	
٨١	Children Cold*	TABLET, CHEWABLE	ORAL	N٠٢BE٥١	Acetaminophen ٨٠mg + Chlorpheniramine maleate ٠,٥ mg + Pseudoephedrin HCl ٧,٥ mg	
٨٢	Chlorpheniramine Maleate ٢ mg/٥ml	SYRUP	ORAL	R٠٢AB٠٢	-	
٨٣	Chlorpheniramine Maleate ٢ mg	TABLET	ORAL	R٠٢AB٠٢	-	
٨٤	Clemastine ١mg	TABLET	ORAL	R٠٢AA٠٢	(as Fumarate)	
٨٥	Collodion	SOLUTION	TOPICAL	V٠٢	(Pyroxilin ٢٠g+Ether ٧٥٠ ml+Alcohol ٢٥٠ ml)/١٠٠٠ ml	
٨٦	Contraceptive DE	TABLET	ORAL	G٠٢AA٠٩	Desogestrel ٠,١٥mg+Ethinylestradiol ٢٠mcg	
٨٧	Contraceptive HD	TABLET	ORAL	G٠٢FA٠٢	Norgestrel (or ١/٢ amount of levonorgestrel) ٠,٥mg+Ethinylestradiol ٥٠mcg	
٨٨	Contraceptive LD*	TABLET	ORAL	G٠٢FA٠٢	Norgestrel (or ١/٢ amount of levonorgestrel) ٠,٢mg+Ethinylestradiol ٢٠mcg	
٨٩	Contraceptive LD/Fe*	TABLET	ORAL	G٠٢AA٠٢	٢١ Tab. [Norgestrel (or ١/٢ amount of levonorgestrel) ٠,٢mg+Ethinylestradiol ٢٠mcg] + [٧ Tab. of ٢٤,٢٥ mg Iron as Ferrous Sulfate or Fumarate)]	

۹۰	Contraceptive Triphasic	TABLET	ORAL	G۰۳AA۰۶	۶ Tab: (Levonorgestrel ۰.۰۵mg + Ethinylestradiol ۳۰mcg) + ۵ Tab: (Levonorgestrel ۰.۰۷۵mg + Ethinylestradiol ۶۰mcg) + ۱۰ Tab: (Levonorgestrel ۰.۱۲۵mg + Ethinylestradiol ۲۰mcg)	
۹۱	Copper and Zinc Sulfate	LOTION	TOPICAL	D۱۱	Copper Sulfate ۱ g + Zinc Sulfate ۱.۵ g + Concentrated Comphor Water ۲.۵ ml + water qs to ۱۰۰ ml	
۹۲	Crotamiton ۱۰٪	CREAM	TOPICAL	P۰۳AX	-	
۹۳	Dexpanthenol ۵٪	CREAM	TOPICAL	D۰۳AX۰۳	-	
۹۴	Dextromethorphan Hydrobromide ۱۵ mg	TABLET	ORAL	R۰۵DA۰۹	-	
۹۵	Dextromethorphan Hydrobromide ۶ mg/ml	DROPS, SOLUTION	ORAL	R۰۵DA۰۹	-	
۹۶	Dextromethorphan Hydrobromide ۱۵ mg/۵ml	SYRUP	ORAL	R۰۵DA۰۹	-	
۹۷	Dextromethorphan Hydrobromide ۱۵ mg	CAPSULE, GELATIN COATED	ORAL	R۰۵DA۰۲	-	
۹۸	Dextromethorphan/Pseudoephedrine ۱۵/۳۰ mg/۵ml	SYRUP	ORAL	R۰۵DA۲۰	(Dextromethorphan HBr ۱۵mg+Pseudoephedrine HCl ۳۰mg)/۵ml	
۹۹	Diclofenac Diethylammonium Salt Eq To diclofenac s ۱٪	GEL	TOPICAL	M۰۲AA۱۵	-	
۱۰۰	Digestive	TABLET, DELAYED RELEASE	ORAL	A۰۹AA	Pancreatin+simethicone ۶۰ mg	
۱۰۱	Dimenhydrinate ۵۰ mg	TABLET	ORAL		-	
۱۰۲	Diphenhydramine Hydrochloride ۲۵ mg	TABLET	ORAL	R۰۶AA۰۲	-	
۱۰۳	Diphenhydramine Hydrochloride ۱۲.۵ mg/۵ml	SOLUTION	ORAL	R۰۶AA۰۲	-	
۱۰۴	Diphenhydramine Hydrochloride ۲۵ mg	CAPSULE, GELATIN COATED	ORAL	R۰۶AA۰۲	-	
۱۰۵	Expectorant	SYRUP	ORAL	R۰۵CA	(Guaifenesin ۱۰۰mg + Chlorpheniramine maleate ۲mg + Pseudoephedrine HCl ۳۰ mg) / ۵ml	
۱۰۶	Fexofenadine Hydrochloride ۱۲۰ mg	TABLET	ORAL	R۰۶AX۲۶	به شرط تولید در داخل کشور	۹۰/۳/۲۳

۱۰۷	Fexofenadine Hydrochloride ۱۸۰ mg	TABLET	ORAL	R۰۶AX۲۶	به شرط تولید در داخل کشور	۹۰/۳/۲۳
۱۰۸	Fexofenadine Hydrochloride ۶۰ mg	TABLET	ORAL	R۰۶AX۲۶	به شرط تولید در داخل کشور	۹۰/۳/۲۳
۱۰۹	Fluoride ۰.۲۵ mg	TABLET	ORAL	A۰۱AA۰۱	(As Sodium)	
۱۱۰	Fluoride ۱ mg	TABLET	ORAL	A۰۱AA۰۱	(As Sodium)	
۱۱۱	Fluoride ۱.۲۳%	GEL	DENTAL	A۰۱AA۰۱	(As Acidulated Phosphate)	
۱۱۲	Fluoride Sodium ۰.۲%	MOUTHWASH	DENTAL	A۰۱AA۰۱	-	
۱۱۳	Glycerin ۱ g	SUPPOSITORY	RECTAL	A۰۶AX۰۱	-	
۱۱۴	Glycerin ۱.۲ mg	SUPPOSITORY	RECTAL	A۰۶AX۰۱	-	
۱۱۵	Glycerin ۲ g	SUPPOSITORY	RECTAL	A۰۶AX۰۱	-	
۱۱۶	Glycerin ۳.۶ mg	SUPPOSITORY	RECTAL	A۰۶AX۰۱	-	
۱۱۷	Guaifenesin ۱۰۰ mg/۵ml	SYRUP	ORAL	R۰۵CA۰۲	-	
۱۱۸	Hematinic	CAPSULE	ORAL	B۰۳AD	VIT. B۱۲ ۱۵mg+Ferrous Fumarate ۳۵۰ mg+VIT.C ۱۵۰mg+Folic Acid ۱mg	
۱۱۹	Hematinic	CAPSULE, GELATIN COATED	ORAL	B۰۳AD	VIT. B۱۲ ۱۵mg+Ferrous Fumarate ۳۵۰ mg+VIT.C ۱۵۰mg+Folic Acid ۱mg	
۱۲۰	Ibuprofen ۲۰۰ mg*	CAPSULE	ORAL	M۰۱AE۰۱	-	
۱۲۱	Ibuprofen ۲۰۰ mg*	TABLET	ORAL	M۰۱AE۰۱	-	
۱۲۲	Iron ۲۵ mg/ml	DROPS, SOLUTION	ORAL	B۰۳AA۰۲	-	
۱۲۳	Lidocaine Hydrochloride ۲%	GEL	TOPICAL	D۰۶AB۰۱	-	
۱۲۴	Loperamide Hydrochloride ۱ mg/۵ml*	SOLUTION	ORAL	A۰۷DA۰۲	-	
۱۲۵	Loperamide Hydrochloride ۲ mg*	CAPSULE	ORAL	A۰۷DA۰۲	-	
۱۲۶	Loperamide Hydrochloride ۲ mg*	TABLET	ORAL	A۰۷DA۰۲	-	

۱۲۷	Magnesium Hydroxide ۸٪	SUSPENSION	ORAL	A۰۲AA۰۶	-	
۱۲۸	Mebendazole ۱۰۰ mg*	TABLET, CHEWABLE	ORAL	P۰۲CA۰۱	-	
۱۲۹	Menthol /Zinc oxide/ Calamine (۰.۴۴/۲۰.۶۲۵/۱۰)g/۱۰۰g	OINTMENT	TOPICAL	D۰۲AB	(Menthol ۰.۴۴g + Zinc oxide ۲۰.۶۲۵g + Calamine ۱۰g)/۱۰۰g به شرط تولید در داخل کشور	۱۳۸۹/۷/۱۷
۱۳۰	Menthol Salicylate	OINTMENT	TOPICAL	M۰۲AC	Methyl Salicylate ۱۵٪+Menthol ۱۰٪	
۱۳۱	Methyl Salicylate ۳۰٪	OINTMENT	TOPICAL	M۰۲AC	-	
۱۳۲	Minoxidil ۲۰ mg/ml	SOLUTION	TOPICAL	D۱۱AX۰۱	-	
۱۳۳	Minoxidil ۵۰ mg/ml	SOLUTION	TOPICAL	D۱۱AX۰۱	-	
۱۳۴	Nicotine ۱۰ mg/ml, ۱۰ ml	SPRAY, SOLUTION	NASAL	N۰۷BA۰۱	-	
۱۳۵	Nicotine ۱۴mg/۲۴h	PATCH, EXTENDED RELEASE	TRANSDERMAL	N۰۷BA۰۱	-	
۱۳۶	Nicotine ۱۵ mg/۱۴h	PATCH, EXTENDED RELEASE	TRANSDERMAL	N۰۷BA۰۱	-	
۱۳۷	Nicotine ۲ mg	GUM	ORAL	N۰۷BA۰۱	-	
۱۳۸	Nicotine ۲ mg	TABLET	SUBLINGUAL	N۰۷BA۰۱	-	
۱۳۹	Nicotine ۲۱mg/۲۴h	PATCH, EXTENDED RELEASE	TRANSDERMAL	N۰۷BA۰۱	-	
۱۴۰	Nicotine ۷mg/۲۴h	PATCH, EXTENDED RELEASE	TRANSDERMAL	N۰۱BA۰۱	-	
۱۴۱	Ophthalmic Bath Solution	SOLUTION	OPHTHALMIC	S۰۱AX۰۷	Boric Acid ۱۶۱۰ mg/۱۰۰ ml	
۱۴۲	Orlistat ۶۰ mg	CAPSULE	ORAL	A۰۸AB۰۱	-	
۱۴۳	ORS	POWDER, FOR SOLUTION	ORAL	A۰۷CA	(Na ۷۵ mmol + K ۲۰ mmol + Cl ۶۵ mmol + citrate ۱۰ mmol + Dextrose ۷۵ mmol) / L	
۱۴۴	ORS	TABLET, EFFERVESCENT	ORAL	A۰۷CA	(Na ۷۵ mmol + K ۲۰ mmol + Cl ۶۵ mmol + citrate ۱۰ mmol + Dextrose ۷۵ mmol)/۶ tablet	

145	ORS	SOLUTION	ORAL	A-7CA	-	
146	Pancreatin	TABLET, DELAYED RELEASE	ORAL	A-9AA	(Chlorpheniramine Maleate 0.5mg + Pseudoephedrine HCl 10 mg)/2ml	
147	Pediatric Grippe*	SYRUP	ORAL	R-9AB09	Rinse-1% W/W	
148	Permethrin 1%	CREAM	TOPICAL		Phenol 9.9 g + Glycerin qs 100 g	
149	Phenol Glycerin 9.9%	DROPS, SOLUTION	OTIC	D-8AE-7	-	
150	Phenylephrine Hydrochloride 0.25%	SPRAY, SOLUTION	NASAL	R-1AA-9	-	
151	Phenylephrine Hydrochloride 0.5%	SPRAY, SOLUTION	NASAL	R-1AA-9	-	
152	Phenylephrine Hydrochloride 0.25%	DROPS, SOLUTION	NASAL	R-1AA-9	-	
153	Phenylephrine Hydrochloride 0.5%	DROPS, SOLUTION	NASAL	R-1AA-9	-	
154	Piroxicam 0.5%	GEL	TOPICAL	M-2AA-7	-	
155	Povidone Iodine 10%	OINTMENT	TOPICAL	D-9AA-9	-	
156	Povidone Iodine 10%	DOUCHE	VAGINAL	G-1AX11	-	
157	Povidone Iodine 10%	GEL	VAGINAL	G-1AX11	-	
158	Povidone Iodine 10%	SPRAY, SOLUTION	TOPICAL	D-8AG-7	-	
159	Povidone Iodine 10%	SOLUTION	TOPICAL	D-8AG-7	-	
160	Povidone Iodine 2.5%	SPRAY, SOLUTION	TOPICAL	D-9AA-9	-	
161	Povidone Iodine 200 mg	SUPPOSITORY	VAGINAL	D-9AA-9	-	
162	Povidone Iodine 7 mg/cm ²	TISSUE	TOPICAL	D-9AA-9	-	
163	Povidone Iodine 7.5%	SPONGE	TOPICAL	D-9AA-9	-	
164	Povidone Iodine 7.5%	SHAMPOO	TOPICAL	D-9AA-9	Surgical Scrub	

165	Povidone Iodine 1.0%	SOLUTION	TOPICAL	D-9AA-9	-	
166	Salicylic Acid (12.5%)	PLASTER	TOPICAL	D-1AE12	Salicylic Acid 16.5g+Lactic Acid 16.5g + Collodion qs to 100g	
167	Salicylic Acid Compound	SOLUTION	TOPICAL	D-1AE12	-	
168	Silver Sulfadiazine 10 mg/g	CREAM	TOPICAL	D-9BA-1	-	
169	Simethicone (Dimethicone Activated) 125 mg	CAPSULE, GELATIN COATED	ORAL	A-1YD	-	
170	Simethicone (Dimethicone Activated) 40 mg	TABLET, CHEWABLE	ORAL	A-1YD	-	
171	Simethicone (Dimethicone Activated) 40 mg/ml	DROPS, SUSPENSION	ORAL	A-1YD	-	
172	Simethicone (Dimethicone Activated) 41.2 mg/ml	DROPS, SOLUTION	ORAL	A-1YD	Yellow soft paraffin 10 g + Wool fat 10 g + Liquid paraffin q.s. 100 g	
173	Simple Eye Oint*	OINTMENT	OPHTHALMIC	S-1XA	-	
174	Sodium Chloride 0.65%	SPRAY, SOLUTION	NASAL	R-1AX	-	
175	Sodium Chloride 0.9%	SPRAY, SOLUTION	NASAL	R-1AX	-	
176	Sodium Chloride 0.65%	DROPS, SOLUTION	NASAL	R-1AX	-	
177	Sodium Chloride 0.9%	SOLUTION	IRRIGATION	B-4CB-1	-	
178	Sucralfate 1 g	TABLET	ORAL	A-1BX-1	-	
179	Sucralfate 500 mg	TABLET	ORAL	A-1BX-1	-	
180	Tetracycline Hydrochloride 3%	OINTMENT	TOPICAL	D-9AA-9	Lactase	
181	Tilactase 300 FCC U	TABLET	ORAL	A-9AA-9	-	
182	Vitamin A 250 U/g	OINTMENT	OPHTHALMIC	S-1XA-1	(Vit. A 100 IU+Vit. D 100 IU) / g	
183	Vitamin A+D	OINTMENT	TOPICAL	A-1CB	-	

۱۸۵	Vitamin B ₁ ۱۰۰ mg	TABLET	ORAL	A۱۱DA۰۱		
۱۸۶	Zinc Oxide ۰.۲۵	OINTMENT	TOPICAL	D۰۲AB		
۱۸۷	Acetaminophen/ Ibuprofen/ Caffeine ۳۲۵/ ۲۰۰/ ۴۰ mg	CAPSULE, GELATIN COATED	ORAL	N۰۲BE۱۱	Acetaminophen ۳۲۵mg + Ibuprofen ۲۰۰mg+ Caffeine ۴۰ mg	۱۳۹۰/۰۷/۰۶
۱۸۸	Guaifenesin ۱۰۰ mg	CAPSULE, GELATIN COATED	ORAL	R۰۵CA۰۳		۱۳۹۰/۰۹/۲۱
۱۸۹	Guaifenesin ۲۰۰ mg	CAPSULE, GELATIN COATED	ORAL	R۰۵CA۰۳		۱۳۹۰/۰۹/۲۱
۱۹۰	Desogestrel ۷۵mcg	TABLET	ORAL	G۰۳AC۰۹	O.T.C فهرست داروهای	۱۳۹۰/۱۲/۲۲
۱۹۱	Dienogest/ Ethinylestradiol ۲/ ۰.۰۳ mg	TABLET	ORAL	G۰۳AA**		۱۳۹۱/۰۲/۰۷
۱۹۲	Zinc Oxide ۰.۲۵	TABLET	ORAL	G۰۳AA۰۹	Desogestrel ۰.۱۵mg+Ethinylestradiol ۲۰mcg	۱۳۹۱/۰۵/۰۲
۱۹۳	Minoxidil ۲٪	AEROSOL,FOAM	TOPICAL	D۱۱AX۰۱	-	۱۳۹۱/۰۵/۰۲
۱۹۴	Minoxidil ۵٪	AEROSOL,FOAM	TOPICAL	D۱۱AX۰۱		۱۳۹۱/۰۵/۰۲
۱۹۵	Contraceptive DE	TABLET	ORAL	G۰۳AA۰۹	Desogestrel ۰.۱۵mg+Ethinylestradiol ۲۰mcg به شرط تولید از ابتدا در داخل کشور	۱۳۹۱/۰۵/۰۲

مثال هایی از زمان مصرف دارو



❖ زمان مصرف

- ✓ آنتی اسید ها بعد غذا
- ✓ متوکلوپرامید نیمساعت قبل غذا
- ✓ هیوسین نیمساعت بعد غذا
- ✓ امپرازول قبل غذا
- ✓ لووتیروکسین صبح ناشتا
- ✓ سیپروفلوکساسین یک ربع قبل غذا
- ✓ فلوکستین پس از صبحانه
- ✓ جم فیروزیل قبل غذا
- ✓ سوربیتول قبل از غذا

- ✓ کلسیم همراه غذا
- ✓ گلی بن گلامید یک ربع قبل غذا
- ✓ مت فورمین همراه غذا
- ✓ ایبوپروفن ، سلکوکسیب ، ناپروکسن
- ✓ دیکلوفناک ، مفنامیک اسید ،
- ✓ پیروکسیکام بعد از غذا
- ✓ لوستاتین ، آتورواستاتین و
- ✓ سیمواستاتین در شب
- ✓ هیدروکینون در شب

❖ نحوه مصرف

❖❖ داکسی سایکلین و آلدرونات به همراه یک لیوان آب مصرف شود و بیمار بعد از مصرف دارو تا یک ربع دراز نکشد .

❖❖ همراه کلسیم یک لیوان آب مصرف شود .

❖❖ همراه سولفاسالازین یک لیوان آب مصرف شود .

❖❖ ترتینوئین را شبها به صورت یک لایه نازک روی پوست قرار دهید .

❖❖ دو قطره (چشمی ،گوشی ، بینی) با فاصله حداقل ۵ دقیقه از هم ریخته شوند .

دلایل رایج و معمول تداخلات دارویی :



بیمارانی که بیشتر در معرض تداخلات
اند :

سالمندان دریافت کننده چند دارو

مبتلایان به بیماری های کبدی ، کلیوی
قلبی ، دیابت ، هیپاتیت ، پنومونی و

آسم حاد

در پیوند کلیه

مصرف کنندگان داروهای ضد
بارداری

بیمارانی که همزمان به چند پزشک
مراجعه می کنند.

کافی نبودن اطلاعات

فاکتورهای غذایی

سن - جنس - وزن

بیماری

الگوی رفتار بیمار

فاکتورهای محیطی (آلودگی های
صنعتی و کشاورزی و ...)

اشکال دارویی


مثال هایی از تداخلات دارویی شایع



تداخل اثر دارو با دارو	تداخل اثر دارو با غذا
تتراسایکلین با کلسیم	تتراسایکلین با لبنیات
تتراسایکلین با آنتی اسیدها	فروس سولفات با چای و شیر
سایمتیدین با وارفارین	سیپروفلوکساسین با لبنیات
سایمتیدین با فنی توئین	کتوکونازول با لبنیات
آنتی اسیدها با	دیگوکسین با لبنیات
سیپروفلوکساسین	
قرص های ضد بارداری با	
آمی سیلین	

آموزش نسخه خوانی

نسخ مبحث عفونی
دکتر فروزان احمدپور



نسخه شماره یک

Rx	قیمت (ریال)
	288800
4(03)(0716)(0177)	
1) Syn. Acetaminophen	16000
(Krizen)	16000
1 ³ قرص	4800
2 sprays Aldomet	11200
2 قرص Aldomet	

Rx	قیمت (ریال)
	288800
11 syn Acetaminophen	16000
4(03)(0716)(0177)	16000
2 sprays Coldamaris	4800
	11200



سرماخوردگی شربت کوریزان
کلداماریس اسپری

نکات نسخه

- تشخیص: common cold
- کلاماریس پروفیلاکتیک چیست؟
- اسپری بینی کلاماریس پروفیلاکتیک حاوی ماده موثره کارازینان و مواد جانبی سدیم کلراید محلول در آب خالص می باشد.
- این فرآورده هیچگونه ماده نگهدارنده ای ندارد و در شرایط آسپتیک در شیشه به حجم ۲۰ میلی لیتر پر می شود که درپوش آن پمپ اسپری ویژه ای می باشد که از آلودگی این فرآورده در حین استفاده جلوگیری می نماید.
- با توجه به ویسکوز بودن اسپری بینی کلاماریس، این فرآورده به صورت منحصر به فردی باعث شکل گیری یک غشاء رطوبی بر روی مخاط بینی می گردد.

نکات نسخه

- بدین صورت کاربرد این محلول باعث ایجاد یک لایه محافظتی فیزیکی در برابر محرک های خارجی بر روی مخاط بینی می گردد که می تواند به عنوان درمان حمایتی مورد استفاده قرار گیرد.
- این لایه رطوبی ویسکوز ویروس های سرماخوردگی را به دام می اندازد، آنها را غیر فعال نموده و از انتشار آنها در مخاط بینی جلوگیری می نماید.
- اگر این اسپری قبل از مواجهه با ویروس سرماخوردگی مورد استفاده قرار گیرد می تواند به صورت چشمگیری باعث کاهش شانس ابتلا به سرماخوردگی گردد. اگر در صورت بروز اولین علائم سرماخوردگی مورد استفاده قرار گیرد اسپری کلداماریس پروفیلاکتیک می تواند به صورت چشمگیری باعث کاهش شدت علائم سرماخوردگی و کوتاه شده دوران ابتلا به آن گردد.

- پایه اصلی اسپری کلداماریس محلول آب نمک می باشد که کارژلوز موجود در آن اولاً باعث می شود که این رطوبت مخاط بینی به مدت طولانی تر در سطح مخاط باقی بماند، مضاف بر اینکه کارژلوز باعث جلوگیری از شیوع و ازدیاد ویروس سرماخوردگی در سلول های اپتیلیوم مخاط بینی و جذب آنها می گردد

نکات نسخه

- از آنجائیکه یُتا-کاراژینان Iota-Carrageenan یک مهار کننده قوی عفونت های رینو ویروسی می باشد، کلاماریس پروفیلاکتیک جهت پیشگیری و درمان ضد ویروسی در سرماخوردگی و آنفولانزا مورد استفاده قرار می گیرد.
- کلاماریس پروفیلاکتیک جهت مرطوب نگه داشتن مخاط بینی و ممانعت از خشک شدن آن ، بویژه در فصول سرد و آلوده ، مورد استفاده قرار می گیرد. این فرآورده در حضور سرماخوردگی اثر ضد ویروسی (آنتی وایرال) از خود نشان می دهد.

نسخه شماره دو

[illegible]

نکات نسخه

- تشخیص سینوزیت مزمن
- درمان سینوزیت مزمن شامل کواموکسی کلاو و یا درمان ترکیبی یک سفالوسپورین (سفکسیم) به همراه کلیندامایسین و یا مترونیدازول به مدت ۴-۶ هفته می باشد.
- درمورد عوارض مترونیدازول شامل تغییر طعم دهان، قهوه ای شدن ادرار و سندوم شبه دی سولفیرام توضیح داده شود.

نسخه شماره سه

مصرف	نام	کد شناسه	سریال	کد ملی	تاریخ تولد	نوع بیمه	است	روز	مهر و امضاء پزشک	مهر و امضاء بیمار	جمع	سهم بیمار
	R lev Cephal	255									46,370	
	tab, Bruf	200									11-3-97/28-9-19	
	tab, Citri	20									37000	
	p d, Cal	5									10000	
	tab, Vira Bed	20									8000	
											12000	
											74000	
											74900	
											22400	
											57420	

نام بیمار	255	تاریخ تولد	11-02-1384	تاریخ پذیرش	19-02-1394
کد شناسه	200	تاریخ ترخیص	21-02-1394	تاریخ بستری	19-02-1394
سوابق	200	تاریخ بستری	19-02-1394	تاریخ ترخیص	21-02-1394
کد ملی	200	تاریخ بستری	19-02-1394	تاریخ ترخیص	21-02-1394
تاریخ تولد	200	تاریخ بستری	19-02-1394	تاریخ ترخیص	21-02-1394
نوع بیمه	200	تاریخ بستری	19-02-1394	تاریخ ترخیص	21-02-1394
درمانگاه شبانه روزی	200	تاریخ بستری	19-02-1394	تاریخ ترخیص	21-02-1394
تاریخ بستری	200	تاریخ بستری	19-02-1394	تاریخ ترخیص	21-02-1394
تاریخ ترخیص	200	تاریخ بستری	19-02-1394	تاریخ ترخیص	21-02-1394
تاریخ بستری	200	تاریخ بستری	19-02-1394	تاریخ ترخیص	21-02-1394
تاریخ ترخیص	200	تاریخ بستری	19-02-1394	تاریخ ترخیص	21-02-1394

Ruf Cephal

tab, Bruf

tab, Citriz

p-d, Cal

tab, Vira Bed

ست

Keflex[®] ۲۵۰

Advil[®] ۲۰۰

قرص استامینوفن ۵۰۰

قرص ویدالکس ۵۰۰

مکمل آکسیدان

خبرنامه

نکات نسخه

- تشخیص عفونت پوستی ناشی از آبله مرغان
- تجویز روتین آسیکلوویر در همه بیماران توصیه نمی شود تنها در این چهار گروه تجویز آسیکلوویر لازم می باشد:
- افرادی که بیشتر از ۱۲ سال سن دارند و واکسینه نشده اند.
- افرادی که دچار عفونت مزمن پوستی یا درگیری ریوی شده اند.
- افراد مصرف کننده کورتیکواستروئید حتی اشکال استنشاقی
- افرادی که سالیسلات را به مدت طولانی دریافت کرده اند.

نسخه شماره چهار

قیمت (ریال)	
نام:	Amoxicillin
کد ش:	۲۲
تاریخ:	۱۳۹۲/۰۵/۰۵
استاد:	۲۲
نام و:	Phenazone
کد د:	۲۲
مبلغ ویزیت (ریال):	۲۲
مهر و امضاء داروخانه و پاراکلینیک	جمع
مهر و امضاء پزشک	۲۲

نکات نسخه

- تشخیص: عفونت ادراری
- خط اول درمان در نوع uncomplicated: کوتریموکسازول، نیتروفورانتوئین
- خط اول درمان در نوع complicated: کینولون ها
- سیپروفلوکساسین: مصرف این دارو در کودکان و نوجوانان به دلیل خطر بروز آرتروپاتی توصیه نمی شود.
- تداخلات یا غذا:
 - ✓ مصرف غذا سرعت جذب را کاهش می دهد اما بر میزان جذب اثر ندارد.
 - ✓ سیپروفلوکساسین سطوح سرمی کافئین را، در صورت مصرف همزمان، افزایش می دهد و به ندرت کریستالوری ممکن است رخ دهد.
 - ✓ تغذیه انترال با مهار جذب سیپروفلوکساسین به میزان بیش از ۳۰٪، منجر به کاهش غلظت پلاسمایی آن می شود.
 - ✓ راهکار: جهت به حداقل رساندن ناراحتی گوارشی می توان دارو را همراه با غذا تجویز کرد.
 - ✓ سیپروفلوکساسین باید حداقل ۲ ساعت قبل یا ۶ ساعت بعد از مصرف فرآورده های لبنی یا آبمیوه های غنی شده با کلسیم یا وعده های غذایی حاوی میزان کلسیم بیش از ۸۰۰ میلی گرم مصرف گردد.
 - ✓ در صورت بروز تحریک بیش از حد قلب یا CNS، مصرف کافئین محدود شود.
 - ✓ در حین درمان مایعات به اندازه کافی مصرف شود.
 - ✓ در صورت تغذیه انترال تجویز سیپروفلوکساسین نباید صورت گیرد.
 - ✓ ۱ الی ۲ ساعت قبل و بعد از مصرف سیپروفلوکساسین، از تغذیه انترال خودداری شود.
 - ✓ تجویز بینی - معدی در مقایسه با تجویز بینی - روده ای، به میزان بیشتری موجب کاهش فراهمی زیستی سیپروفلوکساسین می شود

نکات نسخه

- فنازوپیریدین: برای درمان علائمی نظیر درد، سوزش، احساس دفع فوری یا تکرر ادرار ناشی از تحریک مخاط مجاری ادراری تحتانی برای مدت کوتاه مصرف می شود.
- این دارو دارای اثر بیحس کننده و ضد درد موضعی بر روی مخاط مجاری ادراری است.
- این دارو، رنگ ادرار را به نارنجی متمایل به قرمز تغییر می دهد و ممکن است سبب لک شدن لباس گردد.
- برای کاهش عوارض گوارشی، دارو را باید همراه با غذا یا پس از آن مصرف نمود.

نکات مربوط به نسخه


- تشخیص: complicated UTI
- توصیه به بیمار در مورد مصرف فنازوپیریدین تنها برای ۳ روز
- ذکر نکته تغییر رنگ ادرار بر اثر مصرف فنازوپیریدین
- رعایت فاصله زمانی سیپروفلوکساسین با فراورده های لبنی
- سوال ؟ چه مدت ؟
- توصیه های لازم به بیمار به جهت کنترل عارضه فتوسنسیویتی
- سوال آیا تجویز همزمان سه آنتی بیوتیک در این اندیکاسیون صحیح است؟

نسخه شماره ۵

1.   

Q2 



مهر و امضاء داروخانه  

جراح - دندانپزشک 

جمع
سهم بیمار

		قیمت (ریال)
ردیف	شرح	
1	1. ←	
2	2. →	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		
151		
152		
153		
154		
155		
156		
157		
158		
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		
176		
177		
178		
179		
180		
181		
182		
183		
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		
199		
200		
201		
202		
203		
204		
205		
206		
207		
208		
209		
210		
211		
212		
213		
214		
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		
228		
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		
237		
238		
239		
240		
241		
242		
243		
244		
245		
246		
247		
248		
249		
250		
251		
252		
253		
254		
255		
256		
257		
258		
259		
260		
261		
262		
263		
264		
265		
266		
267		
268		
269		
270		
271		
272		
273		
274		
275		
276		
277		
278		
279		
280		
281		
282		
283		
284		
285		
286		
287		
288		
289		
290		
291		
292		
293		
294		
295		
296		
297		
298		
299		
300		
301		
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		
326		
327		
328		
329		
330		
331		
332		
333		
334		
335		
336		
337		
338		
339		
340		
341		
342		
343		
344		
345		
346		
347		
348		
349		
350		
351		
352		
353		
354		
355		
356		
357		
358		
359		
360		
361		
362		
363		
364		
365		
366		
367		
368		
369		
370		
371		
372		
373		
374		
375		
376		
377		
378		
379		
380		
381		
382		
383		
384		
385		
386		
387		
388		
389		
390		
391		
392		
393		
394		
395		
396		
397		
398		
399		
400		
401		
402		
403		
404		
405		
406		
407		
408		
409		
410		
411		
412		
413		
414		
415		
416		
417		
418		
419		
420		
421		
422		
423		
424		
425		
426		
427		
428		
429		
430		
431		
432		
433		
434		
435		
436		
437		
438		
439		
440		
441		
442		
443		
444		
445		
446		
447		
448		
449		
450		
451		
452		
453		
454		
455		
456		
457		
458		
459		
460		
461		
462		
463		
464		
465		
466		
467		
468		
469		
470		
471		
472		
473		
474		
475		
476		
477		

نکات نسخه

- تشخیص : ابسه دهانی
- سوال ؟ آیا تجویز مترونیدازول به تنهایی در درمان ابسه دندانی صحیح است؟

- Effective against obligate anaerobic organisms. It can be combined with penicillin if anaerobic organisms that produce beta-lactamase enzymes are a concern. Compliance must be considered with a 2-drug regimen. It inhibits DNA synthesis by affecting the helical DNA structure leading to DNA strand breakage causing cell death.

- درمان های تجربی در ابسه دندانی:

- Penicillin VK 500mg PO TID or
- Penicillin G 2-4 million U IV/IM q4-6h or
- Amoxicillin-clavulanate 500mg/125mg PO TID or 875mg/125mg PO BID or
- Clindamycin 300-450mg PO TID-QID or 600-900mg IV q6-8h
- Duration of therapy: 7d

نسخه شماره ۶

		قیمت (ریال)
نام: فاطمه	۱۲۵	۱۰۰
کد شناسایی بیمه: 223909	Secretide	۱۰۰
سریال کد ارجاع (خاص)	۱-۱	۱۰۰
کد ملی: ۱/۱	Secretide	۱۰۰
تاریخ تولد: ۱/۱	۱-۱	۱۰۰
تاریخ منقضی: ۱/۱	۱-۱	۱۰۰
نوع بیمه:	320	۱۰۰
استان:	Active	۱۰۰
نام و کد پزشکی خانواده:	۱۰	۱۰۰

نکات نسخه

- تشخیص: acute exacerbation of COPD
- سوال ؟ آیا می توان به جای جمی فلوکساسین در این نسخه کینولون دیگری انتخاب کرد؟
- سوال ؟ نکات قابل توصیه به بیمار
- نحوه مصرف صحیح سرتاید؟
- آیا دوز سرتاید صحیح است؟

نسخه شماره هفت

۳۸۰۲

نام: ۵۵۷۴۱۷۳۹		کد شناسایی بیمار: ۰۲۴۱-۹۷۲۲۱۵		سرپرست: ۱۷۴-۵۶۶۲۶-۰۱		تاریخ تولد: ۱۳۸۷/۱۱/۲۸		نوع: شرق تهران بزرگ		استان: واحد:		نام و کد پزشک خانواده: پرونده: ۲		کد تشخیص: صفحه:		تاریخ وینیت: ۹۰۱۸۱۲۳		تاریخ: ۹۲۱۷۱۱	
قیمت (ریال)		۹۰۲۵۵۲۸۷		phenon		Egy		key		جمع: ۲۱۰		مهر و امضاء داروخانه و یازا کلینیک: ۲۱۰		مهر و امضاء پزشک: ۲۱۰		سهم بیمار: ۲۱۰		پرداخت بیمار: ۲۱۰	

نکات نسخه

- پنی‌سیلین Penicillin که با نام (open) و (PCN) نیز شناخته می‌شوند.
- پنی‌سیلین G محلول در آب که به سرعت متابولیزه می‌شود.
- پنی‌سیلین G پروکائین که در آن پنی‌سیلین G به پروکائین متصل شده‌است. این شکل دارو آهسته‌تر متابولیزه شده، هنگامی که به صورت داخل عضلانی تزریق می‌شود، درد کمتری ایجاد می‌کند زیرا پروکائین به صورت یک عامل بی‌حس‌کننده عمل می‌کند. در غلظت‌های ۸۰۰۰۰۰ واحدی و ۴۰۰۰۰۰ واحدی با فاصله تزریق ۲۴ ساعتی معروف هستند. برای درمان عفونت‌های شدید به مدت ۵-۱۰ روز به فاصله ۲۴ ساعت تزریق عضلانی می‌شوند.
- پنی‌سیلین G بنزاتین که در آن پنی‌سیلین G به بنزاتین متصل شده‌است. این شکل دارو بسیار آهسته‌تر متابولیزه می‌شود و غالباً به عنوان یک فراورده ذخیره‌ای شناخته می‌شود (به عنوان نمونه آمپول ۱۲۰۰۰۰۰). اثر پنی‌سیلین بنزاتین به آرامی (۲۴ ساعت) شروع شده و به مدت طولانی تری (۲-۴ هفته) می‌ماند. این نوع پنی‌سیلین‌ها بعد از تزریق عمیق عضلانی با مقدار آب مقطر که کارخانه سازنده توصیه می‌کند به شکل یک توده چسبنده داخل عضله می‌ماند و به آرامی از کناره‌ها توسط مایعات بین بافتی تجزیه شده و پنی‌سیلین G را وارد جریان خون می‌کند. این نوع پنی‌سیلین باید با فاصله ماهیانه تزریق شود. مورد مصرف اصلی آن در گلو درد استرپتوکوکی یا همان آنژین چرکی گلو می‌باشد.
- پنی‌سیلین ۶:۳:۳ که به پنی‌سیلین آهسته رهش معروف است و از ۶۰۰۰۰۰ واحد پنی‌سیلین G بنزاتین + ۳۰۰۰۰۰ واحد پنی‌سیلین G پروکائین + ۳۰۰۰۰۰ واحد پنی‌سیلین G تشکیل شده‌است. بعد از تزریق عضلانی ابتدا پنی‌سیلین G فوراً جذب و وارد جریان خون می‌شود (که حدود ۴ ساعت دوام دارد) سپس پنی‌سیلین G پروکائین نسبتاً سریع جذب می‌شود که حدود ۲۴ ساعت دوام دارد بالاخره پنی‌سیلین G بنزاتین به آرامی و در مدت ۳-۴ هفته وارد خون شده و میزان پنی‌سیلین G را در آن مدت در جریان خون در حد درمانی نگه می‌دارد. در عفونت‌های شدید و حاد یک ویال تزریق عضلانی می‌شود و در عفونت‌های مزمن دارای عواقب هر ۴-۵ روز یک ویال از راه عضلانی تزریق می‌شود.

نکات نسخه

- ارترومایسین:
- تداخلات رده X پرهیز:
- آمیودارون، اپریتانت، آستمیزول، آسوناپرویر، بارنیدیپین، ب.ث.ژ (داخل مثانه‌ای)، بیلاستین، بوسوتینیب، بودزوناید (سیستمیک)، واکسن آبله، سیزاپراید، کلیندامایسین (موضعی)، دمپریدون، دوکسوروبیسین (متداول)، دروندارون، انترکتینیب، مشتقات ارگوت، فکسینیدازول، فلیبانسرین، فلوکونازول، فوس اپریتانت، ایوآبرادین، لمبورکسانت، لینکومایسین، لومیتاپید، لوواستاتین، لوماکافتور و ایواکافتور، لوماتپرون، مکیٹازین، میزولاستین، نراتینیب، پازوپانیب، پیموزاید، داروهای آنتی آریتمی کلاس III طولانی کننده (QT با بالاترین خطر)، کینیدین، ریمگپنت، ساکوئیناویر، سیمپرویر، سیمواستاتین، توپوتکان، اولی‌پرستال، وین کریستین (لیپوزومال)

نسخه شماره نه

دستورات پزشک

نام: [Blank]

صفحه: ۷

لطفا محل بارکد ذیل را مخدوش نفرمائید

تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۳/۰۱

شماره بیمه: ۱۰۳۸۶۰۴۶۴۳

نوع بیمه:

شماره سریال: ۸۶۱۸۱۵۶۸۰

شعبه - استان: ۲ استان

شورستان:

مهر و امضاء پزشک:

طرف قرارداد:

مختص بیمه ای قانونی و بیدار
بورد تخصصی ۹۰ ب

قیمت

① ۳۰۰ Tab INH ۷۵۰۰

② ۳۰۰ Cap Rif ۴۰۰۰

③ ۳۰۰ B6 Tab ۱۲۵۰

جمع ۸۱۱۵۰

سهم بیمه شده ۱۵۴۴۵

سهم سازمان ۲۵۸۰۵

تاریخ اعتبار: ۸۶/۱/۱۰

تاریخ ویزه: ۱۸/۱۰/۸۶

نکات نسخه

- ایزونیازید همراه با سایر داروهای ضد سل در درمان سل و به تنهایی برای پیشگیری از بروز این بیماری مصرف می شود.
- نکته نیاز به مصرف همزمان ویتامین B6 با ایزونیازید

نسخه شماره ده

شماره نسخه: ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ - شهرستان: ۰۳ - اداره کل بیمه خدمات درمانی استان

شماره نسخه: ۱۳۹۰ - شهر: ۰۳ - نام: ۱۱۱۶۰۸۷۳۵۳-۲

نوع: ۲ - کد: ۱۱۱۶۰۸۷۳۵۳-۲

نام: ۱۱۱۶۰۸۷۳۵۳-۲

کد: ۱۱۱۶۰۸۷۳۵۳-۲

C.C.: AP1111-90 Dx: ۱۱۱۶۰۸۷۳۵۳-۲

Ampl Aciclovir ۵۰۰

(نسخه دارو خانگی یا کلینیک)

مهر و امضای داروخانه یا کلینیک

مهر و امضای بیمار

مستشار: ۰۳/۰۳/۰۳

جمع: ۰۳/۰۳/۰۳

سهم: ۰۳/۰۳/۰۳

بیمه شده: ۰۳/۰۳/۰۳

سهم: ۰۳/۰۳/۰۳

سازمان: ۰۳/۰۳/۰۳

آموزش نسخه خوانی

نسخ گوارشی
دکتر فروزان احمدپور

نسخه شماره یک

تاریخ اعتبار: ۱۳۹۱/۰۹/۰۴ ... ۷۰۱ اداره کل بیمه خدمات درمانی استان

سن: ۱۳۹۱/۰۹/۰۴ - ۱۳۳ ... ۲۰۱۰۰ ... ۳۶۰۰ ... ۱۲۵۰۰

تاریخ ویزیت: ۹۱۹ ... صفحه: ۱۳۹۱/۰۹/۰۴ - ۱۳۳ ... ۲۰۱۰۰ ... ۳۶۰۰ ... ۱۲۵۰۰

C.C.:	Dx.:	قیمت
1) Tab. Hyoscin روزی ۳ عدد	n=30	
2) Tab. Plavix روزی ۳ عدد	n=30	
3) Solu... ORS		
(نسخه داروخانه، یا پاراکلینیک)		
جمع مهر و امضای داروخانه یا پاراکلینیک		
سهم بیمه شده		
سهم سازمان		

13Aban Pharmacy
1391/09/04 - 13:13
0 - 0 - 2047 - 243

SOC 100
WF 5000
TR 8500

ن. پ. ...

نکات نسخه

❑ هیوسین در رده درمانی آنتی کولینرژیک (آنتی موسکارین) به اشکال دارویی قرص و آمپول وجود دارد.

موارد کاربرد:

❑ تسکین دردهای روده‌ای و درد شکمی کولیک مصرف می‌شود. درمان کمکی در اسهال و سندرم روده تحریک پذیر.

❑ تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی.

❑ درمان دردهای ناشی از انقباض عضلات صاف مانند کولیک کلیوی نیز استفاده می‌شود.

مکانیسم اثر

❑ ضد اسپاسم دستگاه گوارش. این دارو با مهار گیرنده‌های استیل کولین موجب رفع انقباض عضلات صاف جداره روده می‌شود.

عوارض جانبی: خشکی دهان، تپش قلب، بی خوابی، سرگیجه، خستگی، تاری دید، یبوست و اتساع شکم

نکات نسخه

- او آر اس (به انگلیسی: (ORS مخفف: Oral Rehydration Salt) فرآورده‌ای خوراکی است که در اسهال‌های متوسط برای جبران آب و نمک‌های از دست رفته بدن و پیشگیری از دهیدراسیون تجویز می‌شود. اوآراس محتوی قند (گلوکز) و الکترولیت (کلرید سدیم و پتاسیم) و گاه سیترات است و با توجه به وجود گیرنده‌های خاصی در روده که سدیم و گلوکز را همراه هم به داخل سلول وارد می‌کنند در دستگاه گوارش جذب می‌شود.

- اوآراس معمولاً به صورت ساشه‌های حاوی پودر به فروش می‌رسد که باید درست پیش از مصرف به محلول تبدیل شود: پودر درون ساشه را باید طبق دستور روی آن در (اغلب یک لیتر) آب جوشیده سرد شده حل کرد و نوشید



نسخه شماره دو

طاهره کبیری		نام:		PCy pentasa		قیمت (ریال)	
۲۰۱۶۳۵۲۸		کد شناسائی بیمه:		۵۰۰ # 300		۱۵۹۱/۱۵۹/۱-۳۱	
۲۷۰۸۳۵۲۳۰۱۰۰۹		سریال کد ارجاع (داخلی):		درمان خفیه			
۲۷۰۸۳۵۲۳۰۱		کد ملی:		MS prednisolone		# 150	
زن	جنسیت:	۱۳۵۷/۰۶/۲۵	تاریخ تولد:	5mg			
همسر	نسبت:	اجباری	نوع بیمه:	۵۰۰ # 600			
ته تهران	استان:	شرق تهران بزرگ	نام و کد پزشک خانواده:	دکتر شایسته ایرجانی		جمع	
واحد:	پرونده:	۱۳	کد تشخیص:	فوق تخصص گوارش		سهام بیمار	
صفحه:	تاریخ اعتبار:	۹۱/۱۲/۲۹	تاریخ ویزیت:	۲۲/۲۵		سهام سازمان	
						پرداخت بیمار	

نکات نسخه

- کولیت اولسراتیو یک بیماری التهابی روده می باشد که می تواند موجب زخم و خونریزی های گوارشی گردد. این بیماری با علائمی همچون درد شکمی و اسهال بروز می کند.
- بیماری کرون نیز یک بیماری التهابی گوارشی است. زمانی که التهاب در ناحیه ای که روده ی کوچک به روده ی بزرگ متصل می شود رخ دهد، به آن کرون ایلئوس کولیتیس گفته می شود.
- آمینوسالسیلات ها گروهی از داروها هستند که به صورت رایجی در درمان بیماری های روده استفاده می شوند. مزالازین یکی از داروهای معروف و موثر این دسته می باشد.

نسخه شماره چهار

مرکز سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ۱/۲

شماره بیمه: ۲۷۹۱۸۶۴۰۷۰ صفحه: ۹۸

رمز پنه: تولد: ۵۸/۰۶/۲۷ اعتبار: ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۰-۷

نام: هادی خورشیدی

C.C: Dx: 27990000

قیمت

Rx: ① Remicade Amp ۱۰۰۰

۳۳ اعزیزین دستور طبق دستور

13Aban Pharmacy
1391/10/10 - 16:33
3 - 2 - 4300 - 791

SOC	1000
TPB	27990000
SB	27990000
SS	25191000
WP	5000
28050000	

نسخه مخصوص ارائه دهنده خدمات (داروخانه / پاراکلینیک / ...)

حق نسخه نویسی

نسخه نویسی

۵۵۳۱۷

مهر و امضاء تجویز کننده خدمت (پزشک معالج)

سهم بیمه

نکات نسخه

- رمیکاد ۱۰۰ میلی گرم ویال پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال ۱۰۰ mg
- mg ۱۰۰ INFLIXIMAB INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL

- این دارو در درمان آرتریت روماتوئید، بیماری کرون، پلاک پسوریازیس، آرتریت پسوریاتیک، کولیت اولسراتیو و اسپوندیلیت آنکیلوزان به کار می‌رود.

- عوارض جانبی :
- تب، لرز، خارش، کهیر، تنگی نفس، درد قفسه صدری و افزایش یا کاهش فشار خون است. واکنش‌های خفیف با کاهش دوز انفوزیون تزریقی و یا قطع موقت دارو ممکن است برطرف شود. اگر واکنش‌ها شدید است درمان با این دارو باید متوقف شود. دیگر عوارض شایع شامل تهوع و استفراغ، درد شکم، اسهال، خستگی و درد کمر است.

- مشخصات کلی تداخلات:
- - تشدید اثرات سرکوب‌کننده سیستم ایمنی
- • در صورت مصرف همزمان با داروهای با پنجره درمانی باریک با احتیاط مصرف شود؛ شرایط التهابی مزمن می‌تواند تشکیل آنزیم‌های متابولیزه‌کننده را تغییر دهد؛ درمان با داروهای تعدیل‌کننده سیستم ایمنی می‌تواند این اثر را وارونه کند و در نتیجه در سطوح داروهای که همزمان با آن‌ها مصرف می‌شوند، تغییر ایجاد نماید.

- تداخلات رده (X پرهیز):
- آباتاسپت، آناکینرا، ب.ث.ژ (داخل مثانه‌ای)، بلیوموب، داروهای بیولوژیک ضد پسوریازیس، داروهای بیولوژیک ضد روماتیسم تعدیل‌کننده بیماری (DMARD)، کاناکینومب، سرتولیزومب پگول، کلادربین، ناتالیزومب، پیمکرولیموس، ریلوناسپت، تاکرولیموس (موضعی)، توسیلیزومب، واکسن (زنده)، ودولیزومب

نسخه شماره ۵

سرپرست سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

شماره بیمه: ۲۱۲۴۷۹۱۵۲۵

صفحه: ۲۲۳

تولد: ۱۳۶۱-۰۴-۰۳

اعتبار: ۱۳۹۶-۰۶-۱۱

نام: احمد مطلبی

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۰-۷۲

C.C:

Dx:

۸۷۵۰۰۰

قیمت

۱۷

۱ Cup VB-K 300000

۳ Cup Lin support 1000

13Aban Pharmacy

1391/10/10 20:24

1001

500 1000

TPB 875000

SB 262500

SS 612500

WP 5000

TP 393500

نسخه مخصوص ارائه دهنده خدمات دارو و خدمات تشخیصی / کلینیک / ...

دکتر مهتاب

متخصص داخلی

نظام پزشکی ۶۵۰۶۶

جمع

سهم بیمه شده

سهم بیمه

نکات نسخه

- اورسوفار کپسول خوراکی ۳۰۰ mg
- mg ۳۰۰ URSODEOXYCHOLIC ACID CAPSULE ORAL
- این دارو برای انحلال سنگ های غنی از کلسترول در کیسه صفرا و در درمان سیروز صفراوی اولیه مصرف می شود.
- این دارو باید همراه با غذا مصرف شود، ۲. در طول مصرف این دارو، از مصرف داروهای آنتی اسید اجتناب شود.
- کپسول اسلیم ساپورت: حاوی : عصاره چای سبز، قهوه سبز، کامبوجیو و ال کارنیتین سوخت و ساز و متابولیسم بدن را افزایش داده و در کاهش وزن و چربی موضعی موثر می باشد.

نسخه شماره ۶

اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران - ۷۵۵
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ - تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵-۰۶-۰۶

تاریخ ویزیت: ۹۱۰۱
 صفحه: ۱۹

۱۳۰۶۳۱۳۳۹-۰
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
 ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

C.C.:	Dx.:	قیمت
داروخانه لطف		
Tab clonazepam ۲mg طبق دستور	N=1000	
Tab ASA 813 طبق دستور	N=2000	
YCap osteo-Bi-Frey طبق دستور	N=5000	
Tab methotrexate 2.5mg طبق دستور	N=1000	
(نسخه داروخانه... پاراکلینیک)		
مهر و امضای پزشک	جمع مهر و امضای داروخانه یا پاراکلینیک	
دکتر مهدی نجاتی ن.ب. استاد یار و لایق تخصص گوارش و کبد ۲۲۴۵۹		
		سهم بیمه شد سهم سازمان

نکات نسخه

- مصرف همزمان اسید فولیک با MTX لازم است.
- قبل از شروع دارو حتما تست پوستی سل انجام شود.

نکات نسخه

- Osteo Bi-Flex
- مکمل بیماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد، حاوی "Glucosamine، Collagen UC-II، Shield Joint"، MSM و Chondroitin عصاره Boswellia serrata
- گلوکوزامين گلوکوزامين همراه با کندرويتين به عنوان درمان برای استئوآرتريت توصيه می شود. اثربخشی واقعی آن تحت نظر است و می تواند از یک تولید کننده مکمل به دیگری متفاوت باشد.
- گلوکوزامين یک ترکیب طبیعی در غضروف انسانی است و مسئول مایع در اطراف مفاصل است. با این حال، در مکمل ها، پوسته های نرم فلفل ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. این باعث نگرانی برای هر کسی که آلرژی به صدفهای خرگوش دارد. برخی از مکمل ها از گلوکوزامين تولید شده توسط آزمایشگاه استفاده می کنند، بنابراین لازم است که برچسب ها را با دقت بخوانید.
- کندرويتين دیگر ترکیب طبیعی موجود در غضروف، کندرويتين به حفظ آب در پیوستن کمک می کند. در مکمل ها منبع گاندرويتين بیشتر غضروف حیوانی است.
- همچنین لازم به ذکر است که تحقیقات در مورد اثربخشی گلوکوزامين و کندرويتين بسیار متفاوت است. مطالعات و آزمایشات از تولید کنندگان مکمل نتایج مثبتی در اثربخشی آن در تسکین استئوآرتريت نشان می دهد. با این حال، محاکمه های سازمان های مستقل به هیچ وجه به نفع خود به دست نیامده است.

نکات نسخه

- کلاژن UC-II این یک کلاژن اانامشخص است که همچنین گزارش شده است برای حمایت از بهداشت مشترک. این در تعدادی از محصولات Osteo Bi-Flex شامل می شود. در مکمل ها، بیشتر از غضروف جنین مرغ حاصل می شود.
- کلاژن UC-II نتایج مثبت در مطالعات مستقل درمان آرتروز را نشان داده است. یک مطالعه نشان داد که افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو که کلاژن UC-II را دریافت کردند، ۴۰٪ بهبود عملکرد فیزیکی، سفتی و درد را گزارش کردند. این در مقایسه با بهبود ۱۵.۴ درصدی در میان کسانی که ترکیبی از گلوکوزامین و کندروتین را در همان مطالعه دارند، قابل توجه است.
- MSM متیل سولفونیل متیان (MSM) اغلب به عنوان یک مکمل غذایی برای تعدادی از شرایط بهداشتی، از جمله استئوآرتریت به فروش می رسد. برخی از محصولات Osteo Bi-Flex حاوی آن هستند و معمولاً "با MSM" در بسته می گویند.
- MSM ترکیبی است که حاوی گوگرد است که توسط بافت همبندی بدن مورد نیاز است. فکر می کنیم برای مبارزه با التهاب، هرچند یک مطالعه مزایا را به حداقل برساند. همچنین یادآور می شود که اهمیت بالینی MSM و استئوآرتریت ناشناخته است

نسخه شماره ۷

اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران - ۱۳۹۲/۱۰/۰۴
 تاریخ اعتبار: ۱۳۹۲/۱۰/۰۴
 نوع بیمه: ۱۳۹۱/۱۰/۱۰-۳۸
 نام بیمه: عباسی مطلق
 کد: ۱۳۰۱۱۸۸۳۳
 تاریخ ویزیت: ۱۳۹۲/۱۰/۰۴
 صفحه: ۷
 C.C.:
 Dx.: ۹۲۲
 ASacol 800 mg
 ۲۰۰ #
 ASA Col enema
 ۲۸ #
 clidinium
 ۱۰۰۰ #
 ۹۰۰۰
 TFB ۴۲۱۵۰۰۰
 SB ۱۲۶۴۵۰۰
 SS ۲۹۵۰۵۰۰
 MP ۵۰۰۰
 TP ۳۱۰۰۵۰۰
 سهم سازمان
 دکتر سیم آزاده
 ویزیت کننده بیمارستان گوارش و گوارش
 تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۴

نکات نسخه

- مزالازین یا مسالامین (به انگلیسی: Mesalazine) نام تجاری: آساکول رده درمانی: سالیسیلاتها
- موارد مصرف: درمان و پیشگیری حالت‌های خفیف تا متوسط کولیت اولسروز و کرون.

نسخه شماره ۸

اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ - ۷۰۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰-۲۶

نوع بیمه: عامی - نام: ۳۶۰۰۰۰۰۰

سن: ۳۵ - تاریخ ویزیت: ۹۱/۱۰/۲

صفحه: ۱ - ۱۳۰۷۰۶۰۹۵-۱

C.C.:	Dx.:	قیمت
Rx	۹۲۵	
1, Amp. pegasis 180m	۴ = ۱۸۰	
2, Tab. Ribavirin 13Aban Pharmacy	۱۳۹۲/۱۰/۱۰ - ۱۰:۴۰	
2 - 1 - ۴۳۰۰ - ۲۳۷	۴۳۰۰ - ۲۳۷	۱۰۰۰
TPB	۳۶۰۰۰۰۰	
SB	۱۰۸۰۰۰۰	
جم	۲۵۲۰۰۰۰	
۱۱۵	۵۰۰۰	
سهم بیمه شده	۱۰۸۶۰۰۰	
سهم سازمان		

(نسخه داروخانه، پاراکلینیک)

مهر و امضای پزشک: دکتر سید محمد علی...

اسناد و امضای تخصصی: ...

U-691587

نکات نسخه

- آمپول پگاسیس ۱۸۰ میکروگرم/۰.۵ میلی لیتر
- PEGASYS Injection 180 mcg/0.5 ml

• انترفرون آلفا در درمان لوسمی Hairy cell، کوندیلوماتا الکومیناتا، هپاتیت مزمن فعال، سارکوم کاپوسی همراه با ایدز، کارسینوم مثانه، کارسینوم کلیه، لوسمی میلوپیتیک مزمن، پاپیلوماتوزیس لارنژیال، لنفوم های غیر هوچکینی، ملانوم بدخیم، میلوم مولتیپل و میکوزوفونگوئید مصرف می شود. این دارو همچنین در درمان کارسینوم دهانه رحم نیز مصرف شده است.

نکات نسخه

- قرص ریباویرین
- ضد ویروس (نوکلئوزید صناعی).
- (درمان هپاتیت C مزمن
- (درمان عفونت RSV (Respiratory syncytial virus infection)
- مصرف این دارو در زنان باردار اکیدا ممنوع است و جزء گروه X طبقه بندی می شود. ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.
- مصرف دارو همراه غذای چرب می تواند باعث افزایش AUC و Cmax شود.
- راهکار:
- کپسول (در ترکیب با پگ اینترفرون آلفا ۲ (-b و قرص باید با غذا مصرف شوند. دیگر اشکال دارویی با روندی ثابت نسبت به غذا مصرف شوند. (همیشه با غذا یا همیشه بدون غذا)

نسخه شماره ۹

اداره کل بیمه خدمات درمانی استان
شماره: ۱۳۹۱/۱۰/۱۰-۸۲ - شهر: ۷۰۹
نوع بیمه: عادی اصلی - وابستگی: ۱۳۹۱-۶۳
نام: ۱۰۵۰۰۰۰۰
کد: ۱۳۰۵۱۴۳۸-۴۵۰۰۰
تاریخ ویزیت: ۹۱ | ۱۰ | ۱۰
صفحه: ۱

C.C. : Dx. :
22000
100000

Ry 4 cap Ursobil 300 ج
نویس ۳ N=300
21 Tab livergol 140 ج
13Aban Pharmacy
1391/10/10 - 15:35
نویس ۲ N=200 ✓
31 Tab zit 2 R 1 - 300 - 714
نویس ۱ N=100 X
80C 1000
TPB 1007000
SB 389100
SS 907900
۴۱ Tab lasix 40 ج
(نسخه دار و طاقچه، پاراکالینیک)
مهر و امضای پزشک
مهر و امضای داروخانه بیمار اکلیتیک
نویس ۱ N=100 5000
51 Tab spironolone 100 ج
نویس ۱ N=120 568100
مهر و امضای پزشک
مهر و امضای داروخانه بیمار اکلیتیک
نویس ۱ N=120

ن.ش: ۸۷۰۶۸
مهر و امضای پزشک
مهر و امضای داروخانه بیمار اکلیتیک
نویس ۱

نکات نسخه

- قرص لیورگل ۱۴۰ میلی گرم گل دارو از مواد موثره عصاره خشک خارمریم تهیه شده است. لیورگل به عنوان آنتی اکسیدان قوی شناخته شده و در درمان کبد چرب ، هپاتیت حاد و مزمن و کاهش دهنده عوارض سمی داروهای ضد سرطان موثر است.



نسخه شماره ۱۰

۱۰۷۸-۹

۹۳۱۱

۱۵۳۱۳ قیمت (ریال)

D. Panicek ann ۳۵۰۰

۳۲۴۰ ۳۷۲۰ کد شناسایی بیمه

۱۲۶۵ سزیال کد ارجاع (خاص)

۱۱۲۴۵۰۵۰۴ کد ملی

۱۳۹۹/۰۹/۱۰ تاریخ تولد

جنسیت: مرد

نوع بیمه: فریبیت

تستین تهران بزرگ

نام و کد پزشک خانواده: پرونده:

کد تشخیص: صفحه:

تاریخ ویزیت: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

مهر و امضاء داروخانه و پاراکلیشک (ریال)

مهر و امضاء پزشک

دکتر فرامرز درخشان

لوق تخصصی گوارش و کبد - متخصص داخلی

۱۳۳۰۹

۱۵۰۰۰۰۰

۳۳۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۳۳۰۰۰

جمع

سهم بیمار

سهم سازمان

پرداخت بیمار

نکات نسخه

- پنی سیلامین () : (Penicillamine) در درمان بیماران دارای نشانه‌های بیماری ویلسون و پیشگیری از ایجاد آسیب بافتی مصرف می‌شود.
- این دارو همچنین در درمان بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید شدید و فعال که به سایر درمان‌ها پاسخ نداده‌اند، بیمارانی که مبتلا به تشکیل سنگ‌های سیستئینی عودکننده و مسمومیت با فلزات سنگین (به ویژه مس و سرب) هستند، استفاده می‌گردد.
- طبقه بندی فارماکولوژیک : داروی شلات کننده.
- طبقه بندی درمانی : آنتاگونیست فلزات سنگین، ضد روماتیسم.

آموزش نسخه خوانی

نسخه تیروئید و دیابت دکتر فروزان احمدپور



نسخه شماره یک

تهرآن ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ - ۷۹۱۹۹۱/۱۰/۲۵-۲۲

اصلی - اصلی کد ۴۸-۱۳۹۱

۴۱ ۱۰ ۲۵ تاریخ ویزیت

۵۰۰۰۰۰
۳۱۵۰۰۰
۷۰۰۰۰
۴۰۰۰
۶۰۰۰
۱۵۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۴۰۰۰
#۱۵۰
#۱۰۰
#۲۰۰
#۳۰۰
#۴۰۰
#۵۰۰
#۶۰۰
#۷۰۰
#۸۰۰
#۹۰۰
#۱۰۰۰
#۱۱۰۰
#۱۲۰۰
#۱۳۰۰
#۱۴۰۰
#۱۵۰۰
#۱۶۰۰
#۱۷۰۰
#۱۸۰۰
#۱۹۰۰
#۲۰۰۰
#۲۱۰۰
#۲۲۰۰
#۲۳۰۰
#۲۴۰۰
#۲۵۰۰
#۲۶۰۰
#۲۷۰۰
#۲۸۰۰
#۲۹۰۰
#۳۰۰۰
#۳۱۰۰
#۳۲۰۰
#۳۳۰۰
#۳۴۰۰
#۳۵۰۰
#۳۶۰۰
#۳۷۰۰
#۳۸۰۰
#۳۹۰۰
#۴۰۰۰
#۴۱۰۰
#۴۲۰۰
#۴۳۰۰
#۴۴۰۰
#۴۵۰۰
#۴۶۰۰
#۴۷۰۰
#۴۸۰۰
#۴۹۰۰
#۵۰۰۰
#۵۱۰۰
#۵۲۰۰
#۵۳۰۰
#۵۴۰۰
#۵۵۰۰
#۵۶۰۰
#۵۷۰۰
#۵۸۰۰
#۵۹۰۰
#۶۰۰۰
#۶۱۰۰
#۶۲۰۰
#۶۳۰۰
#۶۴۰۰
#۶۵۰۰
#۶۶۰۰
#۶۷۰۰
#۶۸۰۰
#۶۹۰۰
#۷۰۰۰
#۷۱۰۰
#۷۲۰۰
#۷۳۰۰
#۷۴۰۰
#۷۵۰۰
#۷۶۰۰
#۷۷۰۰
#۷۸۰۰
#۷۹۰۰
#۸۰۰۰
#۸۱۰۰
#۸۲۰۰
#۸۳۰۰
#۸۴۰۰
#۸۵۰۰
#۸۶۰۰
#۸۷۰۰
#۸۸۰۰
#۸۹۰۰
#۹۰۰۰
#۹۱۰۰
#۹۲۰۰
#۹۳۰۰
#۹۴۰۰
#۹۵۰۰
#۹۶۰۰
#۹۷۰۰
#۹۸۰۰
#۹۹۰۰
#۱۰۰۰۰

C.C. : Dx. :

۱. Powder sachet mucillin #۶۰۰۰۰

۲. Tob. Mett ۵۰۰ #۴۰۰۰

۳. Cup. Gabapent #۱۵۰

۴. Tob. ut-B, 365 #۱۰۰

۵. Tob. Logen 25 #۲۰۰

۶. Tob. Gybenclamide #۳۰۰

۷. Tob. ASA ۵۰ #۴۰۰

۸. Tob. Aliv #۵۰۰

۱۳۹۱/۱۰/۲۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ - ۲۰۱۵

13Aban Pharmacy

دکتر

لوق تخصص شکر و متابولیسم

نکات نسخه

- ساشه موسیلیوم
- ساشه دارویی ملین و کاهنده کلسترول، حاوی مواد موثره موجود در پودر پوسته دانه گیاه اسفرزه
- مقدار مصرف این دارو جهت ایجاد اثر ملینی به شرح زیر است:
- بزرگسالان: روزانه تا ۳ مرتبه هر بار یک تا ۱/۵ ساشه را در یک لیوان آب و یا آبمیوه ریخته چند دقیقه پس از هم زدن میل نمایید.
- کودکان ۶-۱۲ سال: روزانه تا ۳ مرتبه هر بار نصف ساشه یا به عبارت دیگر ۵ گرم از محتویات ساشه را در یک لیوان آب و یا آبمیوه ریخته چند دقیقه پس از هم زدن میل نمایید.

نکات نسخه

- انواع گوناگون قرص‌های درمان دیابت
- همه‌ی انواع قرص‌های مورد استفاده در درمان دیابت، متعلق به یکی از گروه‌های دارویی زیر است:
- گروه سولفونیل اوره
- گروه مگلتنیدها
- گروه بی‌گوانیدها
- گروه تiazolidinediones
- گروه مهارکننده‌های آلفا- گلوکوسیداز
- گروه مهارکننده‌های DPP-4

نکات نسخه

- سولفونیل اوره‌ها
- داروهای این گروه سلول‌های بتا پانکراس را تحریک می‌کند تا انسولین بیشتری ترشح کند.
- تنها قرص مربوط به نسل اول این گروه که هنوز کاربرد دارد کلروپروپامید (دیابنز Diabinese) است.
- داروهای نسل دوم با دز کمتر نسبت به نسل اول کمتر کاربرد دارد. داروهای نسل دوم عبارت است از: گلی پیزاید (Glucotrol XL) و glipizide (Glucotrol)، گلی بوراید (Micronase)، Gliburide (Glynase)، و (Diabeta)، گلی می‌پراید (glimepiride) (Amaryl). داروهای نسل دوم روزانه یک بار یا دو بار، پیش از غذا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- همه‌ی داروهای گروه سولفونیل اوره اثر مشابه در درمان قند خون دارد، تفاوت این‌ها در عوارض جانبی، زمان مصرف و تداخلات دارویی با داروهای دیگر است.

نکات نسخه

- مگلتنیدها (Meglitinides)
- این داروها نیز سلول‌های بتا را تحریک می‌کند تا انسولین بیش‌تری ترشح کند (مانند گروه سولفونیل اوره). داروهای این گروه عبارت است از:
 - رپاگلی ناید Repaglinide (Pradin)
 - ناته گلی ناید Nateglinide (Starlix)
- این داروها پیش از هر سه وعده‌ی غذایی مصرف می‌شود. شایع‌ترین عارضه‌ی این گروه و گروه سولفونیل اوره‌ها کاهش شدید قند خون (هیپوگلیسمی) است.
- همراه با بعضی از قرص‌های ضد دیابت، نباید الکل مصرف کنید. گاهی مصرف هم‌زمان داروهای گروه سولفونیک اوره (به ویژه کلروپروپامید) همراه الکل سبب استفراغ، برافروختگی و احساس بیماری شدید می‌شود.

نکات نسخه

- بی‌گوانیدها (Biguanide)
- تنها داروی این گروه متفورمین (Metformin (Glucophage) است. متفورمین با کاهش تولید گلوکز توسط کبد، و افزایش حساسیت بافت عضلانی به انسولین قند خون را پایین می‌آورد. افزایش حساسیت بافت عضلانی به انسولین موجب می‌شود قند به راحتی جذب عضلات شود و به مصرف برسد. غالباً ۲ بار در روز مصرف می‌شود. گاهی ممکن است سبب اسهال شود. در این صورت باید قرص را همراه با غذا مصرف کنید تا اسهال شما بهبودی یابد.
- تiazolidinediones
- داروهای این گروه عبارت است از:
 - روسی گلیتازون (Rosiglitazone (Avandia
 - پیوگلیتازون (Pioglitazone (Actos
- این داروها نیز مانند متفورمین با افزایش حساسیت بافت عضلانی و چربی به انسولین و کاهش تولید گلوکز توسط کبد، قند خون را پایین می‌آورد.
- اولین داروی این گروه تروگلیتازون (Rezulin) بود که به علت عوارض کبدی از بازار دارویی حذف شد. دو داروی موجود سبب عوارض کبدی نمی‌شود ولی با توجه به پیشینه‌ی تروگلیتازون، بیمارانی که از داروهای این گروه استفاده می‌کنند از نظر عوارض احتمالی کبدی توسط پزشک معالج مانیتور می‌شوند.
- به نظر می‌رسد هر دو داروی این گروه سبب افزایش ریسک نارسایی قلبی در تعداد کمی از بیماران می‌شود. درباره‌ی ارتباط روسی گلیتازون و افزایش ریسک حملات قلبی بحث ادامه دارد و هنوز به نتیجه‌ی مشخصی نرسیده است.
- این داروها سبب کاهش A1C می‌شود و عوارض جانبی آن‌ها بسیار نادر است.

نکات نسخه

- مهارکننده‌های آلفا- گلوکوسیلاز Alpha-glucosidase inhibitors
- داروهای این گروه عبارت است از:
- آکاربوز (Acarbose (precose
- مگلیتول (Meglitol (Clyset
- این داروها جذب مواد کربوهیدرات‌ی مانند نشاسته، نان، سیب‌زمینی و ماکارونی را در روده به تأخیر می‌اندازد.
- همچنین تجزیه‌های قندهای دیگر همانند شکر و قند خوراکی در روده را نیز به تأخیر می‌اندازد. این داروها از افزایش شدید قند خون پس از غذا جلوگیری می‌کند و روی قند ناشتا تأثیر ندارد. این‌ها را باید با اولین لقمه‌ی غذا مصرف کرد. عوارض آن‌ها عبارت است از: نفخ شکم و اسهال

نکات نسخه

- مهارکننده‌های DPP-4
- این داروها بسیار جدید هستند و بدون افزایش احتمال افت شدید قند خون (هیپوگلیسمی) A1C را کاهش می‌دهد. GLP-1 هورمونی است که پس از مصرف غذا در دیواره‌ی روده ترشح می‌شود و با کاهش سرعت تخلیه‌ی معده، کاهش ترشح گلوکاگون و افزایش ترشح انسولین سبب کاهش قند خون می‌شود. GLP-1 به محض ترشح توسط آنزیمی به نام DPP-4 تجزیه می‌شود و کارکرد آن متوقف می‌شود. این بدان معنی است که اگر شما GLP-1 به بیماری تزریق کنید اثر بسیار گذرا دارد و به زودی از جریان خون حذف خواهد شد.
- کار این داروها این است که آنزیم DPP-4 را مهار می‌کند بنابراین نیمه‌ی عمر GLP-1 را افزایش می‌دهد و در نتیجه GLP-1 سبب کاهش قند خون می‌شود. این داروها موجب افزایش وزن نمی‌شود بلکه اگر به تنهایی مصرف شود ممکن است وزن را نیز کاهش دهد. همچنین ممکن است سبب کاهش کلسترول خون نیز شود.

نکات نسخه

- داروهای این گروه عبارت است از:
- سیتاگلیپتین (Sitagliptin (Januvia , ziptin , sitavix) در ایران این دارو به صورت ترکیب با متفورمین با نام تجاری زیپمت Zipmet و Sitavix توسط شرکت های داخلی عرضه شده است.
- ویلداگلیپتین Vildagliptin.
- ساکساگلیپتین Saxagliptin
- لیناگلیپتین Linagliptin
- اناگلیپتین Anagliptin
- تنه گلیپتین Tenegliptin.
- جمی گلیپتین Gemigliptin
- اوماری گلیپتین Omarigliptin

• مهارکننده‌های «انتقال‌دهنده‌ی همزمان قند و سدیم در لوله‌های کلیه»- به عبارت ساده‌تر SGLT2 Inhibitors

- کاناگلی فلوزین Conagliflozin
- امپاگلی فلوزین Empagliflozin
- داپاگلی فلوزین Dapagliflozin
- ایپراگلی فلوزین Ipragliflozin

نسخه شماره دو

[illegible]

- متی مازول
- موارد مصرف متی مازول
- متی مازول در درمان پرکاری تیروئید مصرف می شود.
- مکانیسم اثر متی مازول
- مهار سنتز هورمون های تیروئیدی (از طریق مهار اکسیداسیون
ید در غده تیروئید)
- - مهار سنتز تیروکسین (T_4 و T_3)
- عدم اثر گذاری بر گردش T_4 و T_3
- ایندرا

نسخه شماره سه

نام:		نام و کد پزشکی خانواده:		تاریخ تولد:		تاریخ ویزیت:	
کد شناسایی بیمه:		نام و کد پزشکی خانواده:		تاریخ تولد:		تاریخ ویزیت:	
سرنام کد ارجاع (خاص):		نام و کد پزشکی خانواده:		تاریخ تولد:		تاریخ ویزیت:	
کد ملی:		نام و کد پزشکی خانواده:		تاریخ تولد:		تاریخ ویزیت:	
تاریخ تولد:		نام و کد پزشکی خانواده:		تاریخ تولد:		تاریخ ویزیت:	
نوع بیمه:		نام و کد پزشکی خانواده:		تاریخ تولد:		تاریخ ویزیت:	
حرف و مقادیر آزاد:		نام و کد پزشکی خانواده:		تاریخ تولد:		تاریخ ویزیت:	
محل اقامت:		نام و کد پزشکی خانواده:		تاریخ تولد:		تاریخ ویزیت:	
نام و کد پزشکی خانواده:		نام و کد پزشکی خانواده:		تاریخ تولد:		تاریخ ویزیت:	
کد تشخیص:		نام و کد پزشکی خانواده:		تاریخ تولد:		تاریخ ویزیت:	
تاریخ ویزیت:		نام و کد پزشکی خانواده:		تاریخ تولد:		تاریخ ویزیت:	

• PTU پروپیل تیوآوراسیل

پروپیل تیوآوراسیل برای درمان پرکاری تیروئید قبل از جراحی و یا رادیوتراپی و نیز درمان کمکی در تیروتوکسیکوز یا طوفان تیروئیدی به کار برده می شود.

۱۵۰۱ - مرکزی ۹/۱۳
بازنهیست

تاریخ و ساعت ۷

نام بیمار: []
شماره پرونده: []

پزشک: دکتر حمید رضا

دستورالعمل:

Thyrogene 0.6mg No. 2

توضیحات:


این نسخه برای بیمار [] صادر شده است.

نکات نسخه

- تایروژن پودر لیوفیلیزه سوسپانسیون تزریقی پرنترال ۰,۹ mg
- THYROTROPIN ALFA INJECTION, POWDER
- mg ۰,۹ LYOPHILIZED, FOR SOLUTION PARENTERAL



نسخه شماره پنج

۹۰-۵۸۰۲		۹۶۵ ۲		۲۸,۸۴۰/-		قیمت (ریال)	
نام: 		کد شناسایی بیمه:		کد ملی: ۰۰۴۲۸۳۴۸۰۵۰۶۹۱۲۹۱		تاریخ تولد: ۸۰/۵/۱۳۴۲	
سریال کد ارجاع (حاصل): ۱۷۱۵۲۵		نوع بیمه: ۱۳۴۲/۰۳/۱۳۴۲		استان: تهران		نام و کد پزشک خانواده: شایران	
کد تشخیص: ۴۲۲۰۰		تاریخ ویزیت: ۹۱/۱۰/۲۰		مهر و امضاء داروخانه و پاراکلینیک: 		جمع: ۲۸۸۴۰۰۰	
صفحه: ۱۵		تاریخ اعتبار: ۹۱/۱۰/۲۰		سهم بیمار: ۲۸۸۴۰۰۰		سهم سازمان: ۰	
پرداخت بیمار: ۰		مهر و امضاء داروخانه و پاراکلینیک: ۹۱/۱۰/۲۰		سهم بیمار: ۰		سهم سازمان: ۰	

Sandoz
2 AR

نکات نسخه



آمپول ساندوستاتین® ۲۰ میلی گرم پودر
لیوفیلیزه سوسپانسیون تزریقی آهسته
رهش پرنترال ۲۰ mg
OCTREOTIDE INJECTION, POWDER,
LYOPHILIZED, FOR SUSPENSION,
۲۰ EXTENDED RELEASE PARENTERAL
mg

اوکترئوتاید در درمان تومورهای
کارسینوئید، ترشح کننده گلوکاگون، ترشح
کننده VIP و آکرومگالی مصرف می شود.

نسخه شماره ۶

اعتبار: ۰۵/۰۶/۱۳۹۴	نام: زینب السادات	رمزین: ۱۳۹۱/۱۰/۰۷-۴۰
تاریخ: ۹۱/۱۰/۰۵	C.C:	Dx: PM. 192000
Metformin Tab 500	600	400800
Proglitazone Tab 15	200	144000
Atorvastatin Tab 20	200	52000
Enalapril Tab 5	400	290400
جمع		192000
سهم بیمه شده		400800
سهم بیمه		144000

نسخه مخصوص ارائه دهنده خدمات (داروخانه / پاراکلینیک / ...)

دکتر مجید رمضان

مفحص داخلی - فوق تخصص غدد و متابولیسم

مستشار دانشگاه علوم پزشکی

مهر و امضاء تجویز کننده خدمت (پزشک معالج)

نسخه شماره ۷

سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

شماره بیمه: ۲۳۳۲۲۰۱۱۴

رمزین: ۴۱۴

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۵

نام: بابی خسرو شاهی

تاریخ: ۹۱/۱۰/۱

1391/10/10-8

C.C:

Dx:

1122000

960000

Lantus solostar Insuline 100 units/ml

n=6

NovoRapid flexPen Insuline 100 u/ml

13Aban Pharmacy

1391/09/10 - 20:59

3 - 2 - 2040 - 1114

SOC 1000

TP 214200

SB 208200

SS 1873800

5000

نسخه مخصوص ارائه دهنده خدمات (کلینیک/...)

دکتر محمدرضا محمد حسینی

لوق تخصص قلب و عروق

۲۹۹۱۰

مهر و امضاء تجویز کننده خدمت (پزشک معالج)

سهم بیمه شده

سهم بیمه

نکات نسخه

- انواع انسولین برای درمان دیابت
- انواع مختلفی از انسولین برای درمان دیابت وجود دارد که براساس شروع اثر، اوج اثر و طول اثر گروه بندی می شوند.
- انواع انسولین عبارتند از:
 - • سریع الاثر
 - • کوتاه اثر
 - • متوسط الاثر
 - • طولانی اثر
 - • مخلوط

انواع انسولین

- انسولین رگولار: یک انسولین انسانی است که از طریق تکنیک های DNA نو ترکیب تهیه می شود و بصورت شفاف است.
- جزء انواع انسولین های کوتاه اثر قرار دارد.
- اثر انسولین رگولار در عرض ۳۰ دقیقه پس از تزریق زیر جلدی ظاهر شده و دارای نیمه عمر بیولوژیکی حداکثر ۱۲ ساعت است.
- مقدار ناچیزی از انسولین رگولار از طریق ادرار دفع می شود.
- دوز انسولین رگولار منحصر به شرایط بیمار می باشد. معمولاً روزانه ۳ تا ۴ بار و هر بار ۱۵ تا ۳۰ دقیقه قبل از غذا بصورت زیر جلدی استفاده می شود.
- انسولین داخل یخچال نگهداری می شود، بعد از باز کردن ظرف انسولین، می توان یک تا دو ماه خارج از یخچال نگه داشت.
- انسولین که داخل یخچال بوده و سرد است، قبل از تزریق باید به دمای اتاق برسد و باید مقداری بین دستان خود نگه دارید تا به دمای بدن نزدیک شود.
- انسولین رگولار شفاف بوده و باید از تجویز محلول کدر یا تغییر رنگ داده اجتناب کرد.

انواع انسولین

- NPH آنالوگ انسولین انسانی است که به روش نوترکیب تولید شده و شیری رنگ است.
- جزء انسولین های متوسط الاثر می باشد.
- شروع اثر انسولین تقریباً دو ساعت پس از تزریق زیرجلدی بوده و حداکثر اثر آن ۵-۶ ساعت پس از تزریق و طول اثر آن ۸-۱۲ ساعت بعد می باشد.
- انسولین NPH، انسولین پایه بوده و زمان تزریق آن، ارتباطی با زمان غذاخوردن ندارد و معمولاً روزی دوبار در روز به فاصله ۱۲ ساعت تزریق می شود.
- در صورت داشتن نارسایی کلیوی و کبدی، حتماً پزشک معالج خود را آگاه کنید.
- در زمان استفاده از این انسولین، باید قندخون را حدود ۶ ساعت بعد از تزریق، کنترل و ثبت کرده و در تمام طول اثر، مراقب افت قندخون بود.
- قبل از مصرف انسولین، باید آن را به آرامی کف دست غلتاند تا بصورت یکدست شیری شود.
- از تکان دادن شدید ویال انسولین بپرهیزید چرا که اثر دارو را کاهش می دهد.
- در صورتی که انسولین در ته ویال معلق و به صورت دانه دانه بنظر رسیده و یکنواخت نباشد، از مصرف آن اجتناب کنید.
- هنگام خرید انسولین، به تاریخ انقضای ویال توجه کنید.

انواع انسولین

- لیسپرو: (Apidra) این انسولین برای مهار افزایش ناگهانی قندخون بعد از غذا مصرف می شود.
- این انسولین بوسیله حلال استریل مخصوص خودش و یا مخلوطهای متفاوت انسولین NPH و رگولار با نسبتهای متفاوت رقیق می گردد و مورد استفاده قرار می گیرد.
- مخلوط این ترکیبات در یخچال تا ۲۸ روز و در دمای اتاق تا ۱۴ روز پایدار می باشد.
- جزء انسولین های کوتاه اثر می باشد.
- این انسولین، از ۱۵ دقیقه مانده به مصرف غذا تا مدت کوتاهی بعد از غذا قابل تزریق است.
- بسیار سریع (در عرض ۱۵ دقیقه) از محل تزریق زیرجلدی جذب می شود.
- پیک اثر از حدود نیم ساعت تا ۱-۲ ساعت بعد از تزریق است.
- طول مدت اثر، ۳-۵ ساعت می باشد.
- ترکیب انسولین لیسپرو با یک انسولین متوسط اثر، بهترین نتیجه را می دهد.

انواع انسولین

- آسپارت: (آسپارت شفاف Novorapid و آسپارت ۷۰/۳۰ Novomix) این انسولین نیز، قندخون بعد از غذا را تنظیم می‌کند.
- آسپارت شفاف: (Novorapid))
- آنالوگ انسولین سریع‌الاث‌ر می‌باشد.
- سریع‌تر از رگولار جذب می‌شود.
- از طریق ادرار دفع می‌شود.
- بلافاصله قبل از غذا تزریق می‌شود.
- همراه یک انسولین کوتاه یا متوسط‌الاث‌ر تجویز می‌شود.
- در دمای زیر ۳۷ درجه باید نگهداری شود.
- شروع اث‌ر، ۱۰-۲۰ دقیقه، اوج اث‌ر ۶۰-۹۰ دقیقه و طول مدت اث‌ر ۴-۵ ساعت پس از تزریق می‌باشد.

انواع انسولین

- آسپارت ۷۰/۳۰: (Novomix)
- باید ۱۵ دقیقه قبل از مصرف غذا، تزریق شود.
- حاوی هر دو مواد شفاف و کدر می باشد و برای تزریق، باید بطور کامل مخلوط و شیری رنگ شود.
- برای مخلوط کردن نباید تکان شدید داده و تنها باید در کف دست غلطانده شود و مخلوط یکنواختی بدست آید.
- در صورت تغییر رنگ یا وجود ذرات کریستالی در داخل ویال، انسولین قابل مصرف نمی باشد.

انواع انسولین

- گلارژین: (lantus, levemir, abasaglar)
- این انسولین طولانی اثر بوده و آهسته جذب می شود.
- شروع اثر انسولین گلارژین تقریباً ۹۰ دقیقه می باشد.
- طول مدت اثر، ۲۴ ساعت است و سطح آن در طول ۲۴ ساعت نسبتاً ثابت است.
- باید هر روز در زمان معینی مصرف شود. (مثلاً هر روز سر ساعت ۱۰ شب)
- ۳۰ تا ۵۰٪ نیاز روزانه بیمار به انسولین می تواند با انسولین گلارژین تامین شود.
- دوزاژ انسولین باید با توجه به وزن بدن، میزان چربی بدن، میزان فعالیت فیزیکی، حساسیت به انسولین، سطح گلوکز خون و سطح مطلوب گلوکز خون تنظیم گردد.



انواع انسولین

- انسولین NPH یا N یا انسولین شیری
- انسولین REGULAR یا R یا کریستال یا انسولین شفاف
- انسولین مخلوط ۷۰/۳۰ که با این نسبت ، از انسولین N و R تشکیل شده است.
- انسولین نوومیکس Novomix یا قلم سرمه ای
- انسولین لانتوس یا گلارژین Lantus یا قلم طوسی/بنفش کم رنگ
- انسولین نوورپید Novorapid یا قلم سرمه ای / نارنجی

فرآورده های انسولین موجود در بازار ایران

نوع اثر	فرآورده	شروع اثر	طول	دوام اثر	شکل فرآورده
با اثر بسیار سریع	Aspart (Novorapid®)	15 min	1 h	4 h	به صورت کارتریج 3 میلی لیتری آماده جهت استفاده از قلم انسولین (300 واحد در هر کارتریج)
با اثر کوتاه	Regular	0.5 h	1.5 h	6 h	به شکل ویال های شفاف 10 میلی لیتری که هر میلی لیتر 100 واحد انسولین دارد یعنی 1000 واحد در هر ویال
با اثر متوسط	NPH (isophane)	1 h	10 h	20 h	ویال های شیری رنگ (سوسپانسیون) 10 میلی لیتری که هر میلی لیتر 100 واحد انسولین دارد یعنی 1000 واحد در هر ویال
با اثر طولانی	Glargine (lantus®)	1.5 h	4.5 h	24 h	ویال های شفاف 10 میلی لیتری (1000 واحدی) و کارتریج 3 میلی لیتری آماده جهت قلم انسولین (300 واحدی)
مخلوط انسولین کوتاه اثر و طولانی اثر	Lansulin® 70/30 Mixtard® 30	مخلوط 70% انسولین ان پی ایچ و 30% انسولین رگولار که به شکل ویال های شیری 10 میلی لیتری و کارتریج 3 میلی لیتری جهت قلم انسولین موجود می باشد.			
	Aspart (novomix®)	مخلوط 70% انسولین آسپارت کریستالی و 30% انسولین آسپارت محلول که به شکل قلم تزریق دارای کارتریج 3 میلی لیتری موجود می باشد.			

نسخه شماره ۸

شماره بیمه: ۳۰۳۶۳۲۹۷۱
رمز پنه: ۴۰
نام: دکتر تیم شریانی
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
صفحه: ۴۱
تولد: ۷۷/۰۱/۰۱
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
C.C:
Dx:
Ro
1 Tab
Levothy - sod
vit D3
500000
130000
168000
140000
130000
1391/10/10 - 18:53
3 - 1 - 2019 - 969
SNC 1000
TPB 30800
SB 9240
SS 21560
MP 5000
T 140200
نسخه مخصوص
تقریباً برای ۳ ماه
پاراکلینیک / ...
مهر و امضاء تحویل کننده خدمت (بیشک معالج)
سهم بیمه شده
سهم بیمه

نکات نسخه

- لووتیروکسین داروی انتخابی درمان کم کاری تیروئید و به عبارتی هورمون جانشین تیروئید است که تداخلات دارویی نسبتاً زیاد و تعدادی تداخلات غذایی را نیز به دنبال دارد .
- مصرف بیش از حد غذای سرشار از فیبر سبب اختلال در جذب هورمون صناعی تیروئید می‌شود. سطح هورمون‌های تیروئیدی با مصرف غذاهای سرشار از فیبر، رژیم‌های غذایی سرشار از محصولات سویا، تخم کتان، گردو، مواد غذایی حاوی کلسیم، داروها یا مواد غذایی غنی شده با کلسیم، آنتی‌آسیدها و محصولات منیزیم که ممکن است حاوی کلسیم باشند، رژیم‌های سرشار از آهن و مصرف بخصوص مکمل‌های آهن و مولتی‌ویتامین‌های حاوی آهن، کاهش می‌یابد. همچنین بهتر است دارو با آب فراوان استفاده شود، زیرا بعضی از نوشیدنی‌های حاوی کافئین مانند نسکافه و برخی آبمیوه‌ها مانند گریپ‌فروت (سبب تغییر اندک در هورمون‌های تیروئیدی می‌شود ولی مصرف مداوم آن باعث تغییرات قابل‌توجهی در سطح هورمون‌های تیروئیدی می‌شود) سبب کاهش جذب دارو می‌شوند.
- برای جلوگیری از تداخل اثر این غذاها یا فرآورده‌ها ، باید آنها را چند ساعت پیش یا پس از خوردن داروی تیروئید مصرف نمود.

نکات نسخه

- جهت فراموش نشدن دارو و عدم تداخل با سایر داروها و احتمالاً غذاها ، خوردن قرص لووتیروکسین صبح ناشتا و ۳۰ الی ۶۰ دقیقه قبل از صبحانه و با مقدار زیادی آب توصیه می شود. توصیه مهم در مصرف لووتیروکسین این است که است که دوز مصرفی هر روز سر یک ساعت معین استفاده شود.
- در کل تداخلات در صورتی اتفاق می افتد که لووتیروکسین همزمان یا در فاصله‌ی زمانی نزدیک به ماده غذایی ذکر شده مصرف شود. بهتر است داروهای تیروئیدی با معده خالی و یا حداقل ۱ الی ۲ ساعت قبل از غذا استفاده شود. در صورت تمایل و یا تجویز مصرف دارو در شب، حتماً ۴ ساعت از خوردن شام گذشته باشد.
- اولین نشانه های بهبودی ، معمولاً چند هفته بعد از شروع مصرف لووتیروکسین آغاز می شود . با بروز علائم بهبودی، مصرف دارو نبایستی قطع گردد . ممکن است نیاز باشد تا آخر عمر از لووتیروکسین استفاده شود.
- در صورت سابقه خونریزی ریه، پوکی استخوان، هرگونه مشکل در غده هیپوفیز و انجام پرتودرمانی بایستی قبل از تجویز داروی لووتیروکسین به پزشک اطلاع داده شود.
- در صورتی که مصرف یک وعده از داروی لووتیروکسین فراموش گردد ، به محض یادآوری دارو مصرف شود اما اگر به زمان مصرف بعدی نزدیک است ، از مصرف دوز فراموش شده اجتناب گردد.

نکات نسخه

- تداخلات دارویی لووتیروکسین
- لووتیروکسین با داروهای زیادی تداخل دارد. برخی از این تداخلات ممکن است با تغییر زمان مصرف داروها، رفع شوند. برای این منظور لازم است مشورت با پزشک صورت گیرد و در زمان تجویز دارو، تمام داروهایی که بیمار در حال مصرف کردن آنهاست به پزشک گزارش داده شود. مکمل ها، مولتی ویتامین ها و داروهای گیاهی و سنتی نیز می توانند با لووتیروکسین تداخل ایجاد کنند.
- در صورتی که داروهای زیر مصرف می شوند باید حداقل بین مصرف با لووتیروکسین ۴ ساعت فاصله داشته باشند: کربنات کلسیم، مکمل کلسیم و... گلوکوکورتیکوئیدها، کلسیتیول، ترکیبات آهن، سوکرافیت، پلی استایرن سولفونات سدیم، کاهش دهنده های اسید معده، اسموپرازول، لانزوپرازول، امپرازول و...، آنتی اسیدها حاوی آلومینیوم یا منیزیم، سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین، افلوکساسین و سایر داروهای این گروه، داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین، کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی توئین، پریمیدون، ریگامپین، استروژن و ضدبارداری های خوراکی، ضدافسردگی (مثل فلوکستین یا آمی تریپتیلین)، داروهای ضداضطراب، داروهای درمان سرطان، اسپرین، مسدود کننده های بتا مثل اتنولول، متوپرولول و پروپرانولول، دیگوکسین، انسولین و داروهای خوراکی درمان دیابت، مکمل های آهن، متادون، استروئیدها مانند پردنیزولون و دکزامتازون، تتوفیلین و حتی ویتامین ها.

آموزش نسخه خوانی

نسخ قلبی عروقی
دکتر فروزان احمدپور

نسخه شماره یک

پا شالی
اداره کل بیمه خدمات درمانی استان خوزستان

شماره سریال: ۱۱۱۵۶۷۳۸۰۹۰۱
تاریخ اعتبار: ۹۱/۰۳/۱۱
تاریخ ویرت: ۱۱

کد بیمه درمانی: ۱۷۳۰۲۳
نام: ...
سن: ...
شماره ملی: ۱۷۵۲۰۱۱۱۰

بیمار با تشخیص ابتدایی: ۳۹۰۰
کد ارجاع: ۶۶۰۰
۱۲۰۰۰
(قیمت) ۵۰۰۰

C.C: R DX: ۵۰۰۰

- Test. ASA ۵۰۰
۱x۱ ۴۳۰

- Test. Metera ۲۰
۱x۲ ۴۳۰

- Test. Metera ۲۰
۱x۲ ۴۳۰

(نسخه دارو خانگی)
مهر و امضاء فارمخانه یا بیمارستان: ۱۰۸۷۶۴-۵۱
۷۳۲۹۵

جمع: ۲۷۵۰۰

نکات نسخه

- تداخل آسپیرین با ایبوپروفن:

- در مواردی که مجبور به مصرف این داروها در روزهای مشابه هستید، توصیه می‌شود فاصله زمانی قابل توجهی میان مصرف آسپیرین و ایبوپروفن ایجاد نمایید. ایبوپروفن در صورتی که با فاصله یکنواخت در طول روز از آسپیرین مصرف شود، عملکردهای آسپیرین را خنثی نمی‌سازد. بنابراین، هنگامی که ایبوپروفن خود را مصرف می‌کنید، حداقل ۸ ساعت برای مصرف آسپیرین صبر نمایید. در غیر این صورت آسپیرین را نیم ساعت پیش از مصرف ایبوپروفن مصرف نمایید.

نسخه شماره دو

یا شانی
اداره کل بیمه خدمات درمانی استان

کد بیمه درمانی: ۵ / ۳ - شوز مستطانی سرریال
نام: ۱۱۵۴۶۲۱-۹-۱
تاریخ اعتبار: ۹۳/۰۱/۲۵
تاریخ صدور: ۹۳/۰۱/۲۵
شماره: ۵۱۶۹-۱۶۹-۱۶۹

با تشخیص: ۱۶۹-۱۶۹-۱۶۹
در تاریخ: ۹۳/۰۱/۲۵
برشک: ۱۱۶۹

C.C: [] DX: [] (قیمت: [])

۱-	Amlapex 5	۱۰۰
۱/۲	Aspirin ۵۰	۵۰
۲-	Septapin 20	۲۰
۳-	Bio Sente 5	۵
۴-	Aspirin ۵۰	۵۰
۵-	Aspirin ۵۰	۵۰
۶-	Aspirin ۵۰	۵۰
۷-	Aspirin ۵۰	۵۰
۸-	Aspirin ۵۰	۵۰
۹-	Aspirin ۵۰	۵۰
۱۰-	Aspirin ۵۰	۵۰

دکتر: []
مهر و امضاء: []
تاریخ: []

اداره کل بیمه خدمات درمانی استان

دوربین شماره سریال: ۷۵۱۰ ۷۴۸۰
صفحه: ۱۱۱۵۶۹۴۳۱۵-۰
تاریخ اعتبار: ۸۵/۰۹/۱۶
مهر و امضاء پزشک: ۷۵۱۰ ۷۴۸۰
شماره ملی: ۷۵۱۰ ۷۴۸۰

کدبیمه درمانی:
نام:
سن:
شماره ملی:

بیمار یا تشبه بیمار با تشخیص: ۵۰۷۶
کد ارجاع: ۵۰۷۶
(قیمت)

C.C:

Tm vpr...
Tm vit...
H₁

امضاء پزشک

مهر و امضاء پزشک

جمع
درصد
سهم

[illegible]

نسخه شماره ۵

باغی
اداره کل بیمه خدمات درمانی استان

۲۰ / ۱ - خوزستان
کتابچه درمانی
نام: ۱۱۱۵۶۲۵۳۳۶-۱
شماره سریال: ۹۲۳
صفحه: ۶
تاریخ اعتبار: ۱۵
شماره ملی همسر: ۱۹۷۱۰۵۴۹۸۴
تاریخ: ۹۳/۰۵/۱۵

بیمار یا تشخیص احتمالی:
به مشخص:
مهری می شود:
که ارجاع:
تاریخ و امضاء پزشک خانواده:

C.C: DX: (قیمت)

- Amp Dobutamin ۵/۱
- Ser Dex ۵۰۵ cc ۴/۱
قبل ترسی
بدون ست سرم

مهر و امضاء داروخانه:
مهر و امضاء پزشک:
نام:
تاریخ:
مهر:

نکات نسخه

- دوبوتامین به صورت تزریقی به عنوان یک داروی اینوتروپیک و برای کنترل برادی کاردی در سکته قلبی، جراحی قلب، آسیب های عضله قلب، شوک سپتیک و کاردیوژنیک و همچنین پیشگیری و درمان کاهش حاد فشار خون مصرف می شود.

نسخه شماره ۶

[illegible]

نسخه شماره ۷

بیمه ۱ ع ۷

اداره کل بیمه خدمات درمانی استان - خوزستان ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ تاریخ اعتبار:

نوع بیمه: دولتی - خ - موسسه: - تبعی: ۱۳۹۰-۵۴۶

نام: سکینه هادی کد: ۱۱۱۷۱۹۸۶-۱

صفحه: ۷ تاریخ ویزا: ۱۳۹۰/۱۱/۲۲

C.C.:	Dx.	قیمت
۱۴	Adaptation	۲۰۰
۲۰	Fusidic	۲۰۰
۳۰	P.oxid.	۲۰۰

(نسخه داروخانه، پاراکلینیک)

جمع و امضای داروخانه یا پاراکلینیک: شهر و امضای پزشک: شهناز سیاحی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۷

نظام پزشکی: ۱۷۵۷۹

اداره کل بیمه خدمات درمانی استان گزی
بازنشسته
و ع بیمه : ک. دولت
ام عزت اله رجایی
۱۱۷۳۱۰۴۳-۰

تاریخ اعشار:
۱۳۸۷/۰۱/۰۱
سن ۵۸-۱۳۸۴
ویسکی اصلی

تاریخ ویزیت
C.C.:
Dx.:
قیمت

Tah ASA 80mg
Lai \$3.
Tah Captopril 25mg
Lai \$3.
Tah Atonax
Lai \$3.
Tah N.E 26mg
Lai \$6
Tah mirtazapine
Lai \$76

(نسخه داروخانه یا پاراکلینیک)
مهر و امضای پزشک معالج یا کارشناس
مهر و امضای مسئول بیمارستان

شماره نسخه
تاریخ نسخه
شماره نسخه
تاریخ نسخه

تاریخ اعتبار:

۱۳۹۰/۰۹/۲۶ خوزستان

۵۶۳

۲۲۶۴

اداره کل بیمه خدمات درمانی استان

تفویض به: فرزندی - تابعیت: دو - ۷-۴۳۸۹

ناظر: رضا شصاخم

۹.۱.۱۵

تاریخ ویزیت

صفحه ۱

۱۱۱۶۰۴۳۵۶۵-۵

C.C.:

قیمت

۴

۵۲۵۰۰

۲۰۰۰

۵۰۰۰

Tib. Di. ۱۰/۱۰/۱۵

۳۰ - ۱۰ - ۱۰ (درج دوم)

۳۰ - ۱۰ - ۱۰ (درج دوم)

۳۰ - ۱۰ - ۱۰ (درج دوم)

۳۰ - ۱۰ - ۱۰ (درج دوم)

۳۰ - ۱۰ - ۱۰ (درج دوم)

۳۰ - ۱۰ - ۱۰ (درج دوم)

۹۱۴۸۵-۸۶

جمع

سهم

بیمه شده

سهم

سازمان

امضا و مهر و انگشت (مستحق دارو و خدمات درمانی)

مهر و امضای پزشک

مهر و امضای مدیرکل

مهر و امضای معاونت

مهر و امضای...

نکات نسخه

- داروی ریتالین
- متیل فنیدات (Methylphenidate) که بیشتر به نام تجاری آن ریتالین (Ritalin) شناخته می‌شود از مشتقات گروه آمفتامین‌ها است که برای درمان بیش‌فعالی، نشانه‌های نارکولپسی و برخی از مبتلایان به افسردگی تجویز می‌شود. از این دارو همچنین در درمان خواب‌آلودگی مزمن (Narcolepsy) در میان افراد میانسال و کهنسال استفاده می‌شود.
- مصرف این دارو برای افراد دارای اضطراب زیاد، فشار عصبی، عصبانیت همراه با بی‌قراری، حساسیت مفرط نسبت به دارو، فشار خون بالا، گلوکوم، افسردگی‌های قابل درمان با داروهای ضد افسردگی رایج، تیک‌های حرکتی و کودکان زیر ۶ سال منع می‌شود

thank you