

تداخلات دارویی

مدرس : بهمن طالباری

تداخلات دارویی

❖ بیماران که بیشتر در معرض تداخلات اند :

1- سالمندان دریافت کننده چند دارو

2- مبتلایان به بیماری های کبدی ، کلیوی ، قلبی ، دیابت ، هپاتیت ، پنومونی و آسم حاد


3- در پیوند کلیه

4- مصرف کنندگان داروهای ضد بارداری

5- بیماران که همزمان به چند پزشک مراجعه می کنند.



❖ دلایل رایج و معمول تداخلات دارویی :



1- کافی نبودن اطلاعات

2- فاکتورهای غذایی

3- سن - جنس - وزن

4- بیماری

5- الگوی رفتار بیمار

6- فاکتورهای محیطی (آلودگی های صنعتی و کشاورزی و ...)

7- اشکال دارویی

❖ عوامل موثر در بروز تداخلات دارویی :

- 1- ترتیب مصرف داروها
- 2- طول مدت درمان
- 3- مقدار مصرف دارو
- 4- شکل دارویی
- 5- وضعیت پیشین بیمار
- 6- مصرف همزمان چند دارو



شایع ترین تداخلات دارویی

❖ تداخل اثر دارو با دارو

تتراسایکلین با کلسیم
تتراسایکلین با آنتی اسیدها
سایمتیدین با وارفارین
سایمتیدین با فنی توئین
آنتی اسیدها با سیپروفلوکساسین
قرص های ضد بارداری با آمپی
سیلین

❖ تداخل اثر دارو با غذا

تتراسایکلین با لبنیات
فروس سولفات با چای و
شیر
سیپروفلوکساسین با لبنیات
کتوکونازول با لبنیات
دیگوکسین با لبنیات

نکات مهم در هنگام مصرف دارو

❖ زمان مصرف

✓ آنتی اسید ها بعد غذا

✓ متوکلوپرامید نیمساعت قبل غذا

✓ هیوسین نیمساعت بعد غذا

✓ امپرازول قبل غذا

✓ لووتیروکسین صبح ناشتا

✓ سیپروفلوکساسین یک ربع قبل غذا

✓ فلوکستین پس از صبحانه

✓ جم فیروزیل قبل غذا

✓ سوربیتول قبل از غذا

✓ کلسیم همراه غذا

✓ گلی بن گلامید یک ربع قبل غذا

✓ مت فورمین همراه غذا

✓ ایبوپروفن ، سلکوکسیب ، ناپروکسن ،

دیکلوفناک ، مگنامیک اسید ،

پیروکسیکام بعد از غذا

✓ لوستاتین ، آتورواستاتین و

سیمواستاتین در شب

✓ هیدروکینون در شب

❖ نحوه مصرف

❖❖ داکسی سایکلین و آلدرونات به همراه یک لیوان آب مصرف شود و بیمار بعد از مصرف دارو تا یک ربع دراز نکشد .

❖❖ همراه کلسیم یک لیوان آب مصرف شود .

❖❖ همراه سولفاسالازین یک لیوان آب مصرف شود .

❖❖ ترتینوئین را شبها به صورت یک لایه نازک روی پوست قرار دهید .

❖❖ دو قطره (چشمی ، گوشی ، بینی) با فاصله حداقل ۵ دقیقه از هم ریخته شوند .



خسته نباشید

